



79
773
12





東醫寶鑑雜病篇卷之二



御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許俊奉教撰

風

中風微漸凡人初覺食指次指麻木不仁或不用者三
 助下各一兩料此治之先明○先服愈風湯不用者
 知未來之疾此其良也其中○風者必有先兆之病
 覺大指及次指三木不仁或手足少力或肌肉
 微掣者此兆也三年內必有大風宜調其榮衛
 先服愈風湯天麻丸或加減防風散其榮衛
 以預防○竹瀝枳木丸或加減防風散其榮衛
 或相間服之亦可預防○凡人手足漸覺不隨
 寒或曾服及股節預防○凡人手足漸覺不隨
 無力雖未致於倒仆其痰相續或六脈浮滑而虛
 無定矣早當從天麻丸之法為表裏之治○初覺
 便服愈風湯及天麻丸相為表裏之治○初覺
 便服愈風湯及天麻丸相為表裏之治○初覺

藥也

調治預防

君于湯之氣血兩虛而痰者二陳導痰等湯以四
南星半夏或覺風邪未退者仍以羌活愈風湯預防
飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風湯預防
通聖散加減法尤好而安
○更散加減法尤好而安

熱生風

甚而卒中之亦非外忘其本也非謂肝木之風實
火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣
佛懣心昏過極而卒中者由五志過極也
五志懣心昏過極而卒中者由五志過極也
甚故也○凡熱者風之體也熱病也○以熱為本
而忽覺心腹中熱甚服治風藥而愈後到夷陵見
一太守夏月忽患熱甚服治風藥而愈後到夷陵見

肥人多中風

肥人多中風者以氣血難通利故多痰理風信若
也人若肥則旬氣衰之際多有此疾壯年之入無
氣出入多中風者以氣血難通利故多痰理風信若
克本膽為肝之府故痰涎壅盛則氣於內也
急養香正氣散之府故痰涎壅盛則氣於內也
治中風之宜中
惡中氣之宜中

中風所因

泄風又病有肺風心風肝風脾風腎風胃風首風
證辨觀○河間曰風邪乃本氣病也
中風者非外來風邪乃本氣病也
風之為病西北氣寒為風所中者識有之東南氣

東醫寶鑑卷之二

生溫而地多濕有風者非風也皆濕生疾極生熱
乎年得經曰亢則害承乃制也○問曰生疾極生熱
論風為虛象而大異於東垣主乎氣丹溪主乎濕反以
論皆為不可偏廢殊不於音人以子觀之真中昔人三子
論三氣因于濕者類風中而風者真中○王安道因有
外之候也夫中人論風之證蓋因先傷於內而後感於
風者言其證也古人論乎此則中風之候可三得而詳論
矣

中風大證 風中於人曰立中曰暴仆曰暴瘳曰蒙昧曰
延壅盛曰眼
賦風虛邪中人 有黃帝問曰余聞四時八風之理閉暑則皮
賦風虛邪中人 有黃帝問曰余聞四時八風之理閉暑則皮

膚緩不乃能理開賊風邪氣因不得以入乎將氣必須
正也邪不得以時然必因其入淺也其深邪氣內極中
病入也卒暴因其閉也其入淺也其深邪氣內極中
何也少師曰寒溫知適腠理不閉然有卒病者其故
月滿則海西盛人血既積也與日月相應也故
堅腠理則邪氣入深至其肉則減皮膚則燥其氣去
形獨居其肉則減皮膚則燥其氣去
治肌者死半治筋脈其風兩故善治者治皮也卒暴
五藏者死半治筋脈其風兩故善治者治皮也卒暴
留邪不去其病則實納○邪乘虛入是謂虛邪納
中風大法有四 一曰肢不舉 二曰身不遂 三曰風懿奄忽不知人 四曰
類風痺諸症

偏枯

血氣偏枯。虛半身不遂。肌肉枯瘦。骨間疼痛。謂之偏枯。榮衛稍衰。則真氣去。邪氣偏。獨留發為偏枯。榮衛在分。手足間宜溫。取汗而然。巨痛言不。變枯。宗筋無帶。脈不引。而然。非道有言。變病發于急。情。

風痺

風痺。神智不亂。身無痛。四肢不舉。一臂不收。志不。其言微。知不可治。甚則不能言。者。一臂不遂。智亂不能言。者。難治。或左。或右。或。步丹。脾實者。膏粱之疾。宜。風。順氣。元。妨。脾。虛。者。十全大補湯。八寶。回春。二。疾。其。偏。枯。身。痛。中。府。也。非。病。身。無。痛。手。足。不。遂。而。言。瘖。志。亂。者。謂。

獨活湯。風。不。能。言。取。手。足。辨。方。獨。活。四。兩。桂。枝。藥。桂。姜。根。各。各。二。兩。生。薑。六。兩。甘草。三。兩。右。七。味。咀。以。水。煎。煮。取。三。升。分。三。服。日。三。

邪入于裏。即東垣。

風懿

風懿。然。迷。仆。舌。強。不。語。喉。中。望。寒。噫。有。聲。謂。之。風。懿。而。不。語。生。汗。不。出。身。直。者。死。由。疾。水。刺。火。閉。心。震。言。病。在。藏。府。汗。出。身。軟。者。生。汗。不。出。身。直。者。七。日。能。

風痺有全門

中風之名各不同

半身不遂。經稱。卒。中。乃。初。中。之。證。也。其。口。眼。歪。斜。中。倒。後。之。證。也。其。舌。強。不。言。唇。吻。不。收。經。稱。為。中。病。世。稱。為。風。懿。內。經。亦。中。倒。後。之。證。也。凡。中。風。脈。無。不。大。者。非。熱。也。是。風。虛。相。搏。邪。在。皮。

脈法

凡中風。脈。浮。而。緊。緊。則。為。寒。浮。則。為。熱。是。風。虛。相。搏。邪。在。皮。

五臟中風形症詳候于下

膚絡正氣引邪不勝邪入于府即不識入邪入于藏
 舌即難言口吐涎沫邪入于府即不識入邪入于藏
 大數三魂孤脈浮滑兼痰其或沉滑勿以風極者
 或浮或沉而微而虛扶危脈溫痰風未可踈以風大
 法浮遲者吉急疾者凶脈浮而大者曰
 風而急者死而數中脈浮而大者曰
 脈浮而數中脈浮而大者曰
 三考治各不同疎中府者面顯五色有表證而
 脈浮惡風寒拘急不仁或中身之後或中身之前
 或不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽
 者多便秘結皆曰中藏其病多難治○血抵中府
 之六經之形證以加減續命湯隨證發其表如兼
 有○中府者先證以加減續命湯隨證發其表如兼

風有中血脉中腑中臟之異

大續命散治風于痺偏枯不仁手
 足拘急疼痛不得屈伸頭眩不能
 自舉此正顛倒或卧苦驚如墮地
 狀盜汗驚悸不起婦人帶下無子
 風入五臟是也恐怖見鬼來收攝
 或與鬼神交通悲恐哭泣忽欲走
 方○馬頭麻黃防風想甘草
 蜀椒杏仁石膏人參芍藥當
 歸川芎黃芩茯苓乾薑石十
 五味治下節以酒服方寸匕再後

中藏則內有便尿之阻隘宜以三化湯或局方之
 仁丸方則養血通氣大至實丹之類愈風墜或活命
 阻限宜養血通氣大至實丹之類愈風墜或活命
 金丹宜排風湯加減排風湯○丹○風中五藏舌痛
 眼瞽宜排風湯加減排風湯○丹○風中五藏舌痛
 塞澁當從愈風湯以行中道久服大風去治
 之法一向之通利加大黃二錢此為常治
 或之法久則清濁自分榮衛自和矣
 小續命湯治卒中風不省人事等及治一切諸症
 防風一錢半防己肉桂杏仁黃芩芍藥人參川
 芎麻黃甘草各一枚煎服子○凡中風六脈已附子
 薑三片石膏二枚用白附子○凡中風六脈已附子
 當歸石膏有熟用白附子○凡中風六脈已附子
 氣太盛心火暴升痰涎壅遏於經絡之中宜用
 續命湯用附子以稟雄壯之資而斬關奪將
 之勢能引入參輩並行於仁輩發表開腠理以驅
 之元陽又引麻黃防風杏仁輩發表開腠理以驅

小續命湯

散其在表之風寒引當歸川芎入血分行血養
血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃
火或加黃芩以清肺金若病勢稍退精神復其
當改用丹溪之法以補氣血清痰之劑以調養其
本氣此急則治其標也
夫標而本之治也

疎風湯

調治風中府手足不仁先宜角表後用愈風湯
烏藥三分右剉作一貼入薑三分枝細辛甘草陳皮生夏

加減續命湯

治風中府垣以六經加減之法實故張易
風無汗惡寒麻黃續命主之本方倍桂枝芍藥杏
仁有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝芍藥杏
本方倍桂枝芍藥杏

三化湯

治府藏俱中風便尿阻不利厚朴大黃枳
利即止

養榮湯

治風中血脈不能舉口不能言或痰迷不省當
歸川芎白芍芍藥生地黃連防風羌活秦艽半夏陳皮
烏藥白茯苓枳實黃連防風羌活秦艽半夏陳皮

排風湯

治風中黃赤茯神各一錢白木仁川芎
仁五分芍藥防風黃赤茯神各一錢白木仁川芎

加減排風湯

治風中黃赤茯神各一錢白木仁川芎
仁五分芍藥防風黃赤茯神各一錢白木仁川芎

排風湯治諸風毒邪氣中口燥悶
絕不識人及身體痠煩面目手足
暴腫者方○犀角非子升麻
羚羊角各兩西石味治下節流
粗散於并半內四寸七煮
取并公滓服五合緩藥者以意
增若腫和雜子傳者三度免
小可與酌減神良亦可多合

已見前卷

羌活湯治風身腫痛四肢微弱
不遂及產後中風方羌活桂心芍
藥葛根麻黃乾地黃各三兩甘草
兩生薑五兩杏仁八枚以酒三
升水五升煮取三升溫服五合日三服

大秦芫湯

治中風外無六經之形證內無便尿之阻
隔知為血弱不能養筋故手足不能運動
舌強不能言活宜養血而筋自榮此主之
膏各一錢羌活獨活川芎白芷生地黄
歸白芍藥三分黃芩白茯苓一貼防風
分細辛三藥黃芩白茯苓一貼防風

羌活愈風湯

治風中府中凡風以本藥治之
盡當服此藥以行導諸經又則風邪已除
分榮衛自和矣蒼朮石膏生地黄黃芩各
風當歸薄荷荆子芎藭細辛黃芩地骨皮
正甘菊薄荷拘杞子柴胡知母地骨皮獨
秦芫黃芩白芍藥甘草各四分或以此湯
一貼入薑三片水煎朝夕服或分肉桂二
療肝腎虛弱筋骨語難精神昏憤或瘦而
或肥而不遂或忍而健忘或喜而多思或
皆精不足也安忍而健忘或喜而多思或
至寶丹治中風急而朱砂雄黃琥珀玳瑁
五錢龍腦麝香各二錢半銀箔五十片金箔
片內半為衣安息香膏二錢酒濾去沙土
右湯化末入安息香膏二錢酒濾去沙土
參湯化末入安息香膏二錢酒濾去沙土
化倉卒難用宜減
半代煉蜜為佳
滋潤湯治風中藏地黃便閉先服此後以
仁名一錢羌活一分紅花酒焙
三分右到作一貼水煎服

卒中風救急

初中倒時隨身醒者宜治若不醒者宜
料宜吐之若口開手散涎壅塞者宜治若不醒者宜
倒不省八參接之若眼戴上者宜灸之
倒不省八參接之若眼戴上者宜灸之
以手大指掐人中頻頻起出四肢急令氣
兩足從上而下頻頻起出四肢急令氣
去惡血或急以氣鍼刺合谷二穴人中一
心即醒或急以氣鍼刺合谷二穴人中一
去惡血或急以氣鍼刺合谷二穴人中一

法如未效用通關散吹鼻即提起頭項開髮任有瘰癧
 可治如口噤不開以破棺散擦之即愈
 痰壅結胸藥不效奪命散一服立愈
 之證多痰涎壅塞治宜豁痰火上升所
 不省痰涎壅塞治宜豁痰火上升所
 噴嚏法次用攝生飲煎湯調蘇合香
 痰盛者加全蝎蘇合元氣風不省通
 黃清心元龍腦蘇合元氣風不省通
 藍汁香油童便

牛黃清心元

治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏
 憤言語蹇澀口眼喎斜手足不遂等證

山藥七錢 甘草二錢 炒五錢 人參蒲黃炒神麴炒各二
 錢 牛犀角二錢 大豆黃卷炒肉桂阿膠炒各一錢
 七分 牛白芍藥麥門冬 桔梗杏仁白茯苓朱砂水飛
 錢二分 牛黃一分 白欬乾薑炮各七分 羊角麝香龍腦各一
 錢 雄黃八分 白欬乾薑炮各七分 羊角麝香龍腦各一

十為末 棗膏八煉 蜜和勻 每二十枚 蒸取肉 研為膏
 衣每取一錢
 溫水化下

牛黃金虎丹

治急中風不省身強口噤鼻乾面黑遍
 形體如醉痰涎壅塞胃喉中如鼓唇青心迷悶

天雄兩 白朮二錢 天竺黃粉 龍腦各五錢 牛黃二錢
 半金箔八片 為衣 右末 煉蜜和勻 每錢一分
 藥行良久 以薄荷汁更化 一新汲水和灌之 扶坐使
 體虛多涎 有風之入 宜常以服藥 隨身備急 氣不
 通延下 魂魄飛揚 如墮江湖 中頃欲絕 骨節
 會頰車 地倉百會 翳曲池 風市三項 絕骨
 髮際 大傾風池 氣通百會 之一梳 繼又下
 伏枕 半月 遂平北蓋灸百會 之一梳 繼又下
 功也 功也 功也

攝生飲

治各一錢半風不省無熟者用此南星炮半夏製

省風湯

治二錢半中風不省有熟者用此防風南星炮各

奪命散

治小兒驚風危急之疾天南星甜葶藶白芷平

開噤法

散卒中風口喎不效凡口喎藥不下者宜用此

開關散

治卒中風口喎牙喎天南星末五分龍腦一

巴豆熏法

治卒中風口喎一條送入鼻內或加皂角末

龜尿解噤

治神妙取尿法以龜坐荷葉上用猪鬃鼻內

取嚏法

吹入鼻中候有嚏可見角細辛末或南星半夏末

通關散

治各一錢中不省口喎氣塞細辛皂角薄荷黃

無嚏不可治如上方南星半夏皂角

等分為末用如上方亦名通關散

通頂散 治卒中不省吹鼻即甦石膏二錢藜蘆川芎

入鼻中即起頂中髮即甦

搐鼻通天散 治同上川芎細辛藜蘆白芷防風薄荷

取吐法 卒中風暴仆昏悶不省人事或痰涎壅塞舌強

之以遇其勢漸○卒中風痰壅盛者口眼喎斜者

散或鯁汁重者○作用法輕者用瓜蒂一分或三分加麝香

少許為末薑汁調和灌入鼻內吐痰出如口不噤

者灌入口內吐痰盛者吐之宜稀涎散瓜蒂散而

鯁汁方 吐鯁出風痰鯁半斤搗葱薑等料物水煮熟

蓋引其風出耳

皂角散 治卒中痰塞皂角薤子等分為末每二

巴豆丸 治如指大一塊為末巴豆二枚去皮膜白礬

赤烏度蜜丸灸實大每一丸綿裹放

熏法 唐王太后中風不能言脉沉而口噤許胤宗曰既

煎黃芪防風湯數斛置于床下氣如烟霧熏之其

夕便得語○中風脉沉口噤非大補不可若用

有之形湯藥緩不及事熏之法不能也蓋人之口通

乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清地

不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎

不治證 卒中風口開手散眼合遺尿鼻聲如鼾者五藏

絕遺尿者腎絕聲如鼾者肺絕也若見一火氣遺

工若面赤時黑主陽氣上散腎水反克心火氣遺

也無形也

尿口開氣喘者斷不可救也
大料參芪濃煎湯救之及臍下大艾炷灸絕速亦
可轉死迴生也如珠吐沫直視者皆不可治
赤如粧汗綴如珠吐沫直視者皆不可治
藏之絡者口眼俱閉可治如口開眼合者散遺尿
鼻聲如鼾及大吐瀉下血吐血者皆死
開者心氣閉也遺尿者腎氣閉也
氣閉絕也眼合者肝氣閉也
也皆不治五證中纔見一證猶可治蓋初則
合者多痰上則鼻鼾者亦多惟遺尿口開俱見
惡心為五藏主腎為五藏根誠不可閉也
動止筋痛名曰筋枯不治無血滋筋故也又肝木
克脾土大便洞泄者亦不治
暴仆與卒中風影
急同然看

暴瘖 凡語澀皆屬風細弱或耳聾腰背相引痛腎瀝
或口噤脚脰枯細弱或耳聾腰背相引痛腎瀝
此湯地黃飲子少陰不至者取也註曰癱廢也腎氣內

肝風占候其口不能言
當灸鼻下人中灸灸大椎
次灸肝腧第九椎下是五
十壯餘處隨年壯眼暗
灸之得明三百壯良

奪則舌瘖足廢
資壽轉舌膏訪
語壽解

腎瀝湯 治腎藏風語音寒吃水一斗煮取五升乃入
玄參白芍藥白茯苓各一兩二錢半黃芪川芎五
味子桂心當歸人參防風甘草各一兩地骨皮五
錢並到再煮取二升去滓分三服效得二

地黃飲子 治中風舌瘖足廢腎虛弱其氣厥不至舌
下熟地黃巴戟山茱萸肉苁蓉石斛遠志
五味子白茯苓麥冬各一錢附子炮肉桂石菖
蒲各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚薄荷少
許同煎空
心服

正舌散 治中風舌強語澀神疲薄荷焙二兩赤茯苓
一兩錫箔二錢半右為末每二錢溫酒調
下藥一兩方茯苓散
兩少用名茯苓散

轉舌膏 治中風舌強不語 即大朱砂散 每加石菖蒲

荷湯化

解語丸 治中風語言不正 附子石菖蒲 遠志全蝎

九菘豆大每五七

清神解語湯 治中風痰迷心竅 言語蹇澀或不省人

浸三日晒乾各一錢 當歸川芎白芍藥生薑皂角水

門冬遠志石菖蒲陳皮白茯苓烏藥枳實黃連防

資壽解語湯 治風中心脾之脈 挾咽連舌本散舌下故

附子羚羊角桂皮各一錢 羌活甘草五分右剉作一貼入薑三片

竹瀝五匙服

精神蒙昧 風中痰昏冒宜用至寶丹 牛黃清心元貼

四白丹 治中風昏冒能清肺氣 養魄甜竹葉三兩白

人參甘草各二錢 薤香白檀各一錢 薄荷各二錢 牛黃各半

錢麝香一字 右為末 蜜和 每見送下 作十丸

二參丹 治中風健忘 養神定志 和血丹 參熟地黃天

人參遠志石菖蒲朱砂各五錢 石菖蒲末 丹蜜丸 梧

活命金丹 治風中藏神 不清大黃一兩 半桂心芒硝

辰砂四錢 內二錢 為末 麝香龍腦各二錢 板藍根

貫眾乾葛甘草各七錢 右為末 蜜水浸蒸餅和勻

每兩作十丸 如瘵風毒茶清化下 臘月收合妙

牛黃定志丸

治心藏中風昏冒精神不守此藥壓驚
二兩雄黃水飛天麻烏蛇肉甘草各一兩
錢半牛黃龍腦全蝎白僵蚕炒白附子炮牛膽製
南星各五錢麝香二錢薄荷湯下
芩仁大每五錢以人參薄荷湯下

祛風至寶丹

治風中藏各一兩二錢半熱滑石一兩半
白芍藥各七錢半白朮六錢半石膏膏黃一兩
地黃天麻八錢羌活獨活各五錢
荆芥薄荷麻黃芒硝黃連大黃黃柏細辛全蝎
二錢半右為末蜜丸彈子大每丸細嚼茶酒任
散加九味也

口眼喎斜

人中後頂髮灸耳垂珠
口眼喎斜或左或右急指入中後頂髮灸耳垂珠
皮為竄視在擊陰則腹皮急緩則四肢不能收急則
一皮為竄視在擊陰則腹皮急緩則四肢不能收急則

下三五壯外南星草烏各一兩白芩一錢
藥白附子白僵蚕全蝎等分末酒調服
○口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡
子畏也內經曰木不及曰委和之紀其動脈

拘強也緩者筋短也庚者口喎斜也拘者筋引
而拘強也拘強者筋短也庚者口喎斜也拘者筋引

縱也○口眼喎斜者筋短也庚者口喎斜也拘者筋引
分經云足陽月手太陽筋急則口目為僻皆急不

能卒視此胃土之筋為邪也經云足陽明筋急不
環唇所生病者口喎斜此胃土之筋為邪也經云足陽明筋急不

牽○口眼喎斜宜用清陽湯順氣湯屏角升麻湯金天
膏正散理氣祛風散清陽湯順氣湯屏角升麻湯金天

清陽湯治中風口喎斜類顯急緊此胃中火盛必汗
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏
紅一錢半甘草一錢蘇木甘草當歸身各五分酒黃柏

服三分温

秦苑升麻湯

治風中手足陽明經口眼喎斜升麻葛

不換金丹

治天麻口喎薄荷一兩川烏生白附子羌活

牽正散

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

理氣祛風散

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

清痰順氣湯

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

犀角升麻湯

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

天仙膏

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

手足癱瘓

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

痛此足陽

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

升麻一錢

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

右剉作一

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

魚血調成

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

虛火流注

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

火鬱結而

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

氣兼散痰

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

瀝薑汁白

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

防風通聖

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

癱服四物

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

湯煎黃芩

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

煎水煎入

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

木香沉香

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

末各五分

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

右剉入薑

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

表回薑

治中風喎斜未每二錢熱酒調下明

身醫全錄卷之二

田魚膏治風濕痺痛四肢癱瘓偏不
仁并腫痛處方○大黃黃芩甘草巴
豆野葛牡丹薔薇花芍藥梔子
蘆附子各二兩石一味吹咀以苦酒清
藥一宿以成煎猪膏三斤微火煎
一下別內白芷一斤三下白芷黃藥
成膏淨微火炙手摩腫上日三

治根退風半身不遂失音不語者方
草麻子脂升酒斗銅鉢盛著酒
中一日煮之令熟服

治大風半身不遂方。薑沙西石熟
蒸分作直條三枚各受斗熱盛
一袋著患處如冷即取餘袋一依
前法敷。換易百不替。應止須羊
肝酸瘦半葱白薑料等爛煮
熟喫日食一具。十日。此方千金
不傳

又方蒸單葉土袋盛慰之瘧
即止

葛根湯治四肢緩弱身體痠痛不遂
煩人產後中風風氣滿方。葛根
芍藥應乾地黃羌活各三兩麻黃
甘草各二兩生薑六兩杏仁以清酒
三升水五升煮取三升溫服五合日三

安胃湯治因飲食汗出日久之
虛風虛邪令人半身不遂見偏身
痿痺之症當先除其汗悞悞之氣
按而收之黃連五味子去子烏梅
去核生甘州各五分熟地日州三
分升麻梢二分右吹咀分作二
服水二盞煎至一盞去粗濕服
食遠忌濕熱酒五辛大料之物

治根退風半身不遂失音不語
者方。杏仁公雙仁及皮共三斗
洗入臼搗碎令碎如粟食粉
法取汁八升煎取四升口嘗看
香滑即熟未及此則為不熟惟
熟為妙停極冷然後內好麴
一斗六升煎取八升第一遍服
醱也次一炊復取杏仁三升研
取一斗二升汁煎取六升第二

○中風皆半身不遂其有遷延歲月不死者何也
曰如木之根本未甚枯而一遷延之歲月不
亦猶氣化之未絕耳故半身雖不運息夫神機未
於機也。瘳而死者。血氣散漫。然筋脈不用也。而
不舉也。瘳者。血氣散漫。然筋脈不用也。而
中風大法。一曰偏枯。半身不遂。二曰風痺。四肢不
舉。即全身不遂也。針。半身不遂。失音。不語。亦謂
之。左。女。尤。忌。右。若。得。此。疾。風。藥。不。宜。有。此。患。但。男。右
忌。左。女。尤。忌。右。若。得。此。疾。風。藥。不。宜。有。此。患。但。男。右
湯。加。味。大。補。湯。也。天。台。散。宜。用。加。減。潤。燥。湯。丹。功。見。除。濕
湯。加。味。大。補。湯。也。天。台。散。宜。用。加。減。潤。燥。湯。丹。功。見。除。濕
虎。骨。散。舒。筋。保。安。散
秘。方。疎。風。順。氣。湯

加減潤燥湯 治左半身不遂屬血虛與死血
白木南星半夏天麻各一錢生地黄黃酒炒熟地黃
薑汁炒陳皮半夏天麻各一錢生地黄黃酒炒熟地黃
甘草灸八分桃仁黃芩活酒炒三分桂各六分紅花酒洗
炒各八分桃仁黃芩活酒炒三分桂各六分紅花酒洗

祛風除濕湯 治右半身不遂屬氣虛與濕痰
半夏蒼朮烏藥枳殼羌活黃連黃芩並酒炒各一
錢人參川芎桔梗防風各八分白芷七分甘草灸
五分右到分煎服 貼入

加味大補湯 治左半身不遂此氣血太虛也
藥熟地黃各七分白朮白茯苓當歸酒洗川芎白芍
防風羌活獨活各五分烏藥牛膝五分附子炮沉
肉桂甘草各三分右到分煎服 貼入

天台散 治中風癱瘓疼痛烏藥陳皮麻黃川芎枳殼
續斷威靈仙甘草各六分乳香沒藥麝香各三分
右到作一貼水煎入乳沒藥麝香各三分

星附散 治中風只手足不遂
附子炮白附子白茯苓南星半夏並薑製各一錢

東醫寶鑑卷之九

酸也次一收準第二酸取杏仁
汁多少為第三酸也若疑米
不足別更取并杏仁研取八
升汁煎取四升更煎酌炊米
酸之若猶不足更研杏仁三升
取八升汁煎取四升更酸之以
以製為限一不米杏仁三斗
所以節次研杏仁者恐其煎
汁酸故也若冬自任意并煎
準計三斗杏仁取汁一石并
煎取八斗四升清麴以分之
酸醱酒熟封四七日開澄取
清然後壓糟糟可乳末和酒
服之大驗秘方

沒藥五分右到作一貼酒

全生虎骨散

赤芍藥續斷白朮藁本虎骨各一兩烏末每二錢溫酒食後調下骨中疼痛加生地

兩黃一

舒筋保安散

一兩節白芍藥天麻威靈仙黃芪當歸防風虎骨各

疎風順氣湯

人參防風麻黃羌活升麻桔梗石菖蒲黃芩荊芥細
天麻南星薄荷葛根芍藥杏仁薑五片水煎更入
辛皂角各五分右對艾灸貼入薑五片水煎更入
竹瀝半盃服之外以艾灸貼入薑五片水煎更入

秘方

治癱瘓如神熟牛骨內臍一椀煉熟蜜一斤二
子大味濃過入炒麩一斤炒乾薑末三兩拌勻如彈
細嚮溫酒下大效

四肢癱瘓搖擗為風疾

或伸動而不止名曰癱瘓俗謂之搖擗者甚也
癱瘓者令肌肉跳動也癱瘓者令手足不牽引一
縮癱瘓者令手足不牽引一縮癱瘓者令手足不牽引一

痰涎壅盛

漸消尚有風邪未退以羌活開化痰為先急則
中痰壅盛者營先吐之然後用他藥調之凡初
骨節皆有痰涎所以轉動滑利中風則涎上潮
中痰壅盛者營先吐之然後用他藥調之凡初
時宜用導痰湯久枯了減導痰湯大省風

湯沉香半夏湯三錢飲青州白元子龍星丹蘇青元
導痰湯治中風痰盛語澀眩暈筋脈不舒加香附子烏
連名曰清熱導痰湯名曰順氣導痰湯名曰寧神導痰湯
痰湯○加遠志菖蒲芥連沙名曰寧神導痰湯

加減導痰湯治中風痰盛不能言語熱者宜服南星
乾白茯苓陳皮白木桔梗枳殼各一錢黃芩黃連
瓜蒌仁人參當歸木香各五分甘草三分右剉作

滌痰湯治中風痰迷心竅舌強不能言半夏南星並
入薑蒲入麥竹茹各五分甘草三分右剉作一錢
簡而當也

大省風湯治中風痰盛喎斜不遂防風半夏生各二
貼一錢全蝎三片水煎服

沉香半夏湯治中風痰盛去痰醒脾和氣益心附子
夏製二錢南星一錢右為粗末每服三錢水煎服

三生飲治卒中風痰塞昏什不省脉沉無熱者可服
煎服右剉作一錢入薑十片煎服

青州白元子治中風痰涎壅塞小兒驚風等症切風
煎服右剉作一錢入薑十片煎服

加味青州白元子治中風痰涎壅塞小兒驚風等症切風
糊和九梧子大薑湯吞下五錢右並生為細末薑汁麩

蝎麝白元子療者半夏七兩南星三兩白附子二兩

更上...

大防風湯治風熱發熱汗肢節煩
腹重痛大便不利方○防風當歸
麻黃白朮甘草各十八銖黃芩三
銖乾薑山茱萸茯苓附子各
一兩半味以水九升煮取二
升半一服之食後不利內大黃
人參各十八銖大棗三十枚生薑
三兩煮取三升分三服

川烏天麻防風各一兩全蠍五錢麝香半錢右並
生烏末薑汁糊和九梧子大薑湯下三五丸
便風舒展經三五日頻數後當有汗
龍星丹治風熱壅痰涎盛昏冒眩暈牛膽南星朱砂
一錢片腦三錢黃芩黃連各二錢全蝎防風薄荷各
蜜九櫻桃牛黃麝香各三字加青黛一錢化下
方拘時○櫻桃牛黃別以朱砂為衣每丸一錢
蘇青元氣字散又兼理痰凡風熱痰生無不治也
湯九下三四

中風熱證因風者百病之始也善行而數變行者動也風
也宜大秦羌湯坊見天麻九宜以靜勝其躁是養血
兼攻宜防風通聖散○麻九熱宜用小通聖散人
清氣宣風散透水丹

天麻丸治風補血行榮衛壯筋骨生乾地黃四兩羌
杜仲大活各九兩空以溫酒或白湯吞下
防風通聖散治頭風熱或傷風諸般風搐小兒驚風
積熱或瘡疥或頭黑陷生白屑或面鼻生瘡赤不能辨明或
風熱瘡或大風癩疾或風火鬱甚為腹滿或大
渴喘悶或熱極生風為舌強口噤筋肉滿或大
小瘡腫惡毒或熱結大便不通并解酒傷熱毒
暈○滑石一錢七分甘草一分木通二分石膏黃芩桔
連翹各七分防風四分荆芥白朮各三分黃芩薄荷
剉作一貼入薑三五片煎服也
此方治熱風燥三煎服也

小通聖散治風熱頭痛咽疼腫各一錢防風薄荷當
一各五分葉七片同煎服
心

入參羌活散 治中風痰盛煩熱羌活獨活前胡人參
蔓荊子桔梗甘草各七分右剉作一劑煎服

川芎石膏散 治與通聖散無麻黃芒硝有神寒水石人參縮
砂劑法服

清氣宣風散 治風熱當歸白朮白芍藥各一錢川芎
赤茯苓各五分甘草三分右剉作一劑煎服

透冰丹 治風毒上攻頭面腫痛瘡疥癩瘻及癱瘓
川烏二兩以江水浸半月三日換水切作片焙
乾用鹽一兩炒黃去鹽大黃梔子茯苓神威靈仙蔓
荆子益智白茯苓各一錢一茅右剉作一劑煎服

燒醋淬細研麝香各一錢一茅右剉作一劑煎服

中風虛證 凡中風年逾五旬氣衰之際多有此疾壯年
八寶迴春湯 治風補虛及手足風累驗當歸杜仲防風白
川芎獨活秦艽熟地黃各四分右剉作一劑煎服

萬金湯 治風補虛及手足風累驗當歸杜仲防風白
貼水煎服若手指無力不半劑可愈

八寶迴春湯 治一切風虛諸證去風和氣活血大有
去白芍藥一分附子錢二分黃芪八分白朮六分附子杏仁
夏各五分陳皮防風肉桂乾薑熟地黃生乾地黃
川芎當歸四分沉香烏藥川烏各三分右剉作一劑煎服

中風宜調氣 治風良劑小續命湯為上排風湯次之然
入薑三片棗二枚水煎服右
味去風八味和氣八味活血

大風湯治毒風頑痺手足脚不
遂身體偏枯或毒弱不仁或風入五臟
恍惚多語喜忘有時恐怖或肢
節痠痛眩暈或腹脊痠痛直不得
俯仰腹滿不食或喉或始遇病時年
倒閉絕不能語使失聲半身不隨
不仁沈重皆由體虛時少不避風冷
所致治之方○當歸二兩半五味子
升麻各兩半烏頭黃芩芍藥遠
志獨活防風芍藥麻黃秦艽石斛
人參茯苓石黃黃芩紫苑各一兩
杏仁四枚甘州桂心乾薑各三四大
豆并右三味以水可升
酒并各煮取四升強入四分服麻
人分六服

更著...

順氣散 佐助其間氣 一氣 流行則風亦疎矣 散

人參順氣散 治中風氣虛 喘 八味 順氣散 亦疎矣 散

烏藥順氣散 治一切風疾 先服此 疎通氣道 進以風

各一錢 半川芎 白芷 白僵蚕 一貼 入薑 三片 棗 二錢 乾

薑 五分 甘草 三分 右剉 作一貼 入薑 三片 棗 二錢 乾

水煎服 獨

八味順氣散 凡中風 宜服此 以順氣 又云 凡

勻氣散 治中風 氣虛 不遂 白木 二錢 烏藥 一錢 半人

風非大汗則不除 風從汗散 故治風 多能治風 而千

金多用麻黃 則反為大害 此時續命散 煎散 復榮 衛

汗更用麻黃 則反為大害 此時續命散 煎散 復榮 衛

却風邪 不可缺也 明邪 况服藥 發汗 之不可療 平

人居室 不密 尚中風 邪 况服藥 發汗 之不可療 平

換骨丹 治中風 喎斜 癱瘓 及暗風 癱瘓 蒼不 槐實 桑

荆子 各一兩 苦參 五錢 木香 各五錢 龍腦 麝香 分

各五分 右為末 以麻黃煎膏 和搗 萬祥 每一兩 分

定不透氣 食後 臨卧 一呷 燕之 衣覆 取汗 島以 物合

起衰翁 我氣 壯骨 丹傳 之極 幽秘 疎開 山張 仙心 扶

三百八十歲 槐皮 芎朮 許人 砂首 蔓十 件各 煎

膏丸 粒小 如指 彈修 合在 深房 勿除 神陰 人見 伴

服一丸 煎膏 治汗 津滿 萬病 自消 除神 陰人 見伴

入湯藥 煎膏 或用 此膏 丸藥 服之 辨規

續命煮散... 黃川芎獨活防己甘柳杏仁各三兩
想附子茯苓麻細辛人參防風各
二兩石膏五兩白朮四兩芍藥三兩
下以方寸匕內小絹袋中以水煎和生薑
三兩煮取汁半升分服日三服慎風冷

去風丹

治一切諸風及癱瘓風大風破傷風
紫背浮

淋酒內下着水曬乾為末蜜丸
靈草彈子大每以豆
不在岸始因飛絮逐東風泛梗青漂水不在山間
一在起沉病採我之時七月半選甚難風與風
些少微風都汗不筭豆一酒內下三九鐵
僕頭上微風也出汗不筭豆一酒內下三九鐵

續命煮散

治風虛自汗桂皮七分半防風獨活當歸
遠志半入夏甘草各五分右剉
作一貼入薑三片同煎服

風病須防再發

藥以病雖愈必再發則必重常須服
以防瘡癢妨視心愈再發則必重常須服
致倒仆勹宜服定風餅子如最忌房室如道不
也修養可

定風餅子

治川烏南星半夏白薑川芎白茯苓甘草
麻中風面喎鼻淵痰厥頭痛眩暈嘔吐天

小中不須深治

足名曰小中不宜用正風藥深治但用手
衣右等分為末薑汁和丸實大作餅子朱砂為
生每餅細嚼薑湯下預防疾爽慧神志歸手

中風能食

此中風人多能食蓋甲己化土脾盛故能多食
廣服藥不欲多食病能自愈○中風多食者風木
盛也木盛則克脾脾受敵求助于食經曰實則夢
與虛則夢取當瀉肝木治風安

傷風證

宜傷風則涕流鼻塞重則戴氏云新咳嗽鼻塞
聲重是也宜參蘇飲冲和散防風冲和湯
寒腫見○有汗而惡風此真感風證也

諸風病名

如頭風多饒白屑○毒風面上生瘡○刺風狀
旋眼○頑風不辨東西○瘡風面生朱點○肝風鼻悶

東醫寶鑑卷之五

風病治法
 陽用 陰或 酒浙 乳青 風白 汗盛 膝偏 風半 虫行 斷眼
 明力 或中 或動 羊青 大癩 風癩 痛虛 行肺 指睜
 中若 中於 中形 羊青 大便 腫如 虛風 行肺 指睜
 於飲 於於 於起 吐燥 肌風 如賊 風不 腎鼻 甲兩
 項食 陽陽 邪毫 大極 溢肌 風語 風遂 風塞 脫臉
 則汗 上上 氣者 風青 〇風 〇風 〇風 〇風 〇風
 下出 下毛 者虛 成盲 軟通 陰囊 濕〇 濕〇 濕〇 濕〇
 太陽 左而 虛者 片〇 身痒 濕〇 濕〇 濕〇 濕〇
 陽理 右發 風所 爛〇 身痒 濕〇 濕〇 濕〇 濕〇
 中開 無有 理之 瘡〇 烏臂 烏臂 烏臂 烏臂
 於而 恒〇 邪之 傷〇 體〇 體〇 體〇 體〇
 頰中 常〇 邪之 傷〇 體〇 體〇 體〇 體〇
 則於 邪〇 邪之 傷〇 體〇 體〇 體〇 體〇
 下邪 方〇 方〇 方〇 方〇 方〇 方〇 方〇
 少中 虛〇 虛〇 虛〇 虛〇 虛〇 虛〇 虛〇
 陽於 面〇 面〇 面〇 面〇 面〇 面〇 面〇
 其中 則〇 則〇 則〇 則〇 則〇 則〇 則〇
 於下 新〇 新〇 新〇 新〇 新〇 新〇 新〇

治風歷年歲或歌或哭或大笑言
 語不語不及古。麻黃人參桂白
 木各二兩芍藥甘草防己黃芩
 芍藥當歸各二兩芍藥防己黃芩
 水一斗煮取五升分三服日三服取
 汗

諸風通治
 府背 膏背 膏背 膏背 膏背 膏背 膏背 膏背
 者宜 者宜 者宜 者宜 者宜 者宜 者宜 者宜
 兩脇 兩脇 兩脇 兩脇 兩脇 兩脇 兩脇 兩脇
 之中 之中 之中 之中 之中 之中 之中 之中
 其經 其經 其經 其經 其經 其經 其經 其經
 宜下 宜下 宜下 宜下 宜下 宜下 宜下 宜下
 〇風 〇風 〇風 〇風 〇風 〇風 〇風 〇風
 有中 有中 有中 有中 有中 有中 有中 有中
 藏可 藏可 藏可 藏可 藏可 藏可 藏可 藏可
 寧府 寧府 寧府 寧府 寧府 寧府 寧府 寧府
 之過 之過 之過 之過 之過 之過 之過 之過
 多也 多也 多也 多也 多也 多也 多也 多也
 分中 分中 分中 分中 分中 分中 分中 分中
 表也 表也 表也 表也 表也 表也 表也 表也

通氣驅風湯
 錢半 枳殼 人參 芎藭 白芷 羌活 獨活 陳皮 白朮 甘草 薑三片 棗二枚
 治中 風口 眼斜 半身 不遂 痰涎 壅盛

常山太守馬灌酒除風氣通血脈益精
華之附聰明耳目悅澤顏色頭骨更
黑齒落髮生服藥三日力勢倍六
十日志氣充盈今月能夜書百日
致神明房中強壯如平時力能引
弩年八人服之當有子病在腰膝
藥志主之方○天雄三兩商陸根
躑躅蜀椒各兩烏頭一枚附子
五枚桂白飲苗芋乾薑各三兩
右十味以酒以絹袋盛酒三升漬春
夏百秋冬七日春初服半合稍加
至兩三合痛汗為散酒服方寸七日三
以知為度夏日恐酒酸以油淨覆度
下并中近水令不酸也

水煎服
祛風通氣散
一名

秘傳順氣散

治中風喎斜癱瘓一切風疾青皮陳皮
枳殼桔梗烏藥人參白朮白茯苓甘草
川芎白芷細辛麻黃防風乾薑五片水煎服
各六分右到作一貼入薑五片水煎服

烏藥順氣散

治中風流注經絡四肢痠痛筋脈拘
攣宜多汗以手經絡四肢痠痛筋脈拘
木香保命丹

木香保命丹

治中風一切諸證木香活絡羌活白附子生桂皮
甘菊牛膝酒浸白虎骨酒炒全蝎炒威靈仙酒洗
天麻當歸蔓荊子虎骨酒炒全蝎炒威靈仙酒洗
防風山藥甘草酥炙赤箭各五錢朱砂七錢半
為衣麝香一錢半右為末蜜丸彈子大朱砂為衣

禦風丹

治中風口眼歪斜半身不遂神昏語澀麻黃
川芎白芍藥桂枝細辛白蘘菔羌活南星各七錢半
右末蜜丸彈子大朱砂為衣

化下

烏龍丹

治中風口眼歪斜手足攣曳言語蹇澀神驗
腦麝香各半錢和皮膠五錢靈脂各二兩為末入龍
以薑汁研化次日煖酒調服一日兩服五七丸便
可以自梳頭步

一粒金丹

治一切諸風川烏炮附子炮白附子炮各
及藥各五錢朱砂細墨麝香各二錢半右為末
以墨汁和勻每兩作六丸金箔為衣每九薑汁
和酒半盞溫熱調服出汗為效

換骨丹

治中風喎斜癱瘓一切風疾青皮陳皮
枳殼桔梗烏藥人參白朮白茯苓甘草
鐵彈元

鐵彈元

治中風喎斜癱瘓一切風疾青皮陳皮
枳殼桔梗烏藥人參白朮白茯苓甘草
和九彈子大每一九薄荷酒化為末滴乳

辟異錠子

治一切諸風及破傷風小兒急慢驚風疾

川芎白芷人參薄荷木香白朮茯苓神各五錢牛黃
龍腦乾生薑白附子各三錢麝香二錢全蝎二十
斤甘草用白蠶二兩蜂窠二十一兩煎作膏子入藥末和勻兩

風痺之始

內經曰風之為病出而風吹之血凝或於膚者則為痺
實痺○虛邪○中之人所湊其氣必虛留而不行則
為不仁也○痛○不仁者何明之則為痺○氣不仁謂
不柔和也○痛○不仁者何明之則為痺○氣不仁謂

三痺

內經曰黃帝曰痺之安生岐伯曰風寒濕三氣
痛痺宜茯苓湯着痺宜川芎茯苓湯三痺湯

防風湯

治行痺走注無定防風一錢半當歸赤茯苓
秦芫葛根各三分甘草剉作一貼

茯苓湯

治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫赤茯苓桑
右剉作一貼入棗二枚

川芎茯苓湯

治着痺四肢麻不拘擊浮腫赤茯苓桑
當歸各一錢桂枝皮各一錢半川芎防風黃赤芍藥

三痺湯

治風痺氣血凝滯手足拘攣擊浮腫赤茯苓桑
當歸各一錢桂枝皮各一錢半川芎防風黃赤芍藥

五痺

帝曰其有五者何也岐伯曰此以冬遇此者為骨痺
舍此者為肌痺以秋遇此者為筋痺以夏遇此者為脈痺以春遇此者為肉痺以冬遇此者為骨痺

杜仲酒治腰脚疼痛不遂
風虛方○杜仲八兩石南三兩
羌活四兩大附子五枚右四味
以酒一斗漬三宿每服三
合日再偏宜冷病婦人服之

東坡醫案

二二

而不去者內舍於腎筋痺不己復感於心邪痺不己復感於肝脈感於邪
內舍於腎筋痺不己復感於心邪痺不己復感於肝脈感於邪
已復感於心邪痺不己復感於肝脈感於邪
於脾皮痺不己復感於心邪痺不己復感於肝脈感於邪
以府者何也岐伯曰此亦其飲也
六府者何也岐伯曰此亦其飲也
也六府者何也岐伯曰此亦其飲也
含其府也納○滯氣喘息痺聚在肺滯氣憂思入痺
聚氣心絕滯氣遺尿痺聚在脾諸痺不己亦益內也
滯氣心絕滯氣遺尿痺聚在脾諸痺不己亦益內也
氣謂氣之妄行者也從外去則益深而氣散
內納○氣宜用五痺湯增味五痺湯足一錢弱麻痺羌活
五痺湯治風寒濕氣客留肌體甘草一錢弱麻痺羌活
貼入薑七片
水煎服

增味五痺湯
一錢甘草七片公煎服
一貼入薑十片公煎服
治風寒濕氣客留肌體
防己薑黃白朮海東皮當歸白芍藥各

行濕流氣散
治風寒濕氣客留肌體
仁二兩白茯苓一兩半蒼朮羌活防風

痺脈
錢烏炮各一兩石末每二
錢溫酒或蔥白湯調下
為痺脈○風寒濕氣合而為痺浮瀉而緊三脈乃

痺病形證
內經曰帝曰痺或痛或不痛或重或不仁或寒或多
也者有寒故痛也其不痛不仁者久入深榮氣多
行溢經絡時疎故不痛不仁者久入深榮氣多
者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣
多陰氣少病甚也勝陽乘陰故為痺熱其多汗而濡
者此其逢濕也病在筋氣少陰氣盛兩氣相感故汗
出而濡也○病在筋氣少陰氣盛兩氣相感故汗
痺病在肌膚皮膚盡痛名曰痺痺在骨則重在肉則不
可舉骨痛痺在肌膚皮膚盡痛名曰痺痺在骨則重在肉則不
為病不痛何也岐伯曰痺在骨則重在肉則不
疑而不沉在於筋則屈而不伸在於肉則不仁在血

痺病形證

二

諸痺感勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也又痺入深榮衛溢絡時疎則不知痛

風痺不可已者如履水時艾湯腹中腹脹滿燥煩心頭痛傷脾胃時暈眩時汗出傷胃眩傷肝悲

恐短氣不樂傷肺不出三年死

痺病吉凶 皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則縱納也

痺病多兼麻木 雖不知痛痺尚覺氣微流行在手多兼風濕在足多兼寒濕不覺流行則非惟

風痺與痿相類 曰痺陰陽俱在病者命曰風痺湯者在陰者命也陰者裏與下也痺者氣閉塞不通流也或痛

痺病難治 似故世俗與風痿通治此千古之弊也六抵

痺病治法 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺證病名及用藥 筋痺宜用羚羊角湯○風寒痺宜用烏藥順氣散

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

痺病 痺之起以行濕用參芪歸地則氣血滯而邪鬱

疎通氣道

附子湯

治風寒濕合而為痺骨節疼痛皮肉不仁

獨痺湯

治手足冷痺一云冷痺者身寒不熱腰脚沉重

大豆蘖散

治周痺以下不能左右各當其大隨脈以上

升麻湯

治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮

五物湯

治血痺夫尊榮人骨弱肌膚虛疲勞汗出而

羚羊角湯

治筋痺肢節束痛羚羊角桂皮附子獨活

歷節風病

因風所致之痛皆由汗出入水或飲酒汗出當

汗出入水

亦成痲疾久而不已令人骨節蹉跌

白虎

節風甚如虎咬曰白虎風之證必夜甚行於陰也

病自安

謂之痛風也○古之痛痺即今之痛風也

治宜辛溫

之劑流散寒濕開發腠理血行氣和

血得寒汚濁凝滯

所以作痛夜則痛甚行於陰也

謂其後或涉冷水

或立濕池或坐卧當風取涼熱

愈黃芪桂枝白芍藥各三錢

右剉作一貼入生薑

三服

一方有人參

三片

大棗三枚水煎

右剉作一貼

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

三片水煎

入薑

大歷節風者久不始者令人骨節
 變敗變成癩病不可不知古今以來
 問貴賤得苦之此是風毒害者
 也治之雖有湯藥而不及松膏松
 節酒
 又痛處灸三七壯佳

歷節風證狀

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指
 掣不能屈伸蓋由飲酒當風如汗出入水或體虛如
 空掩護不謹以致風寒濕之邪過歷關節與血氣
 搏而多斯疾也其痛如掣者為風多過身腫如脫者
 為濕多斯節間黃汗出者為風多過身腫如脫者
 疼痛盡靜夜間狀如虎咬者謂之白虎歷節久不
 治令人骨節蹉跌須當大作湯丸不可拘以尋常
 淺近之劑

歷節風治法

痛風多屬血虛血虛然後寒熱得以侵之
 或用趁痛散不離四物治痛風法主血熱血虛血
 或挾痰皆不離四物治痛風法主血熱血虛血
 陳皮蒼朮薑汁隨證加減可謂發前人甘草桃仁
 也。○治痛風大法蒼朮南星川芎白芷當歸酒
 芥在上加羌活威靈仙桂枝無味而薄者能橫
 己木通黃柏切。○薄桂治痛風無味而薄者能橫
 行手以臂致氣血凝滯津液留久則佛鬱堅牢阻
 經絡以臂致氣血凝滯津液留久則佛鬱堅牢阻

防已湯治風歷節四肢疼痛如掣
 不可忍者方○防已茯苓白朮桂枝
 各四兩甘草三兩人參三兩烏頭七枚
 右八味咀以苦酒一升水一斗煮取三
 升半服八合日三夜一當覺復熱
 瘡忽然慎勿怪也若不覺復合服
 以覺乃知
 大棗湯治歷節疼痛○大棗十五
 枚附子一枚甘草尺黃耆四兩生薑
 二兩麻黃五兩右六味咀以水七升
 煮取三升每服一升日三合
 治歷節風方○松膏一升酒三升
 浸七日每服一合日再數劑愈
 又方松葉三十斤酒三石再漬三
 日服一合日五六度
 松節酒治歷節四肢疼痛由
 如解落方見下單方

趁痛散

趁痛散治痛風多屬血虛血虛然後寒熱得以侵之
 痛風多屬血虛血虛然後寒熱得以侵之

大羌活湯

大羌活湯治風濕相搏肢節疼痛不可屈伸羌活獨活
 白朮當歸赤芍藥酒調下

蒼朮復煎散

蒼朮復煎散治風濕熱痛風蒼朮四兩黃柏三錢柴
 胡升麻藥酒調下

白朮當歸赤芍藥酒調下

蒼朮四兩黃柏三錢柴胡升麻藥酒調下

胡升麻藥酒調下

蒼朮四兩黃柏三錢柴胡升麻藥酒調下

防風湯治身體四肢節解如脫
 腫按之皮陷頭眩短氣溫
 亂欲吐者方○防風白朮知母
 桂心各四兩芍藥黃芩杏仁
 甘草各二兩半夏生薑各十兩
 咀以水斗煮取三升分四服日三
 夜一合今錄驗方在半夏杏仁
 一川芎用附子二枚為八味

花二分右剉先以水二碗煮蒼朮至一鐘去渣服至二

防風天麻散

治風濕痺走注疼痛或偏枯或暴瘖

烏炮子白附子荆芥穗當歸甘草各五錢右為末蜜

丸彈子大每取半丸或一丸熱酒化下覺藥力運

疎風活血湯

治四肢百節流注刺痛或紅當歸川芎威

靈仙白芷防己黃栢南星蒼朮羌活桂枝各

四妙散

治風濕走注威靈仙酒蒸五錢羊角末每

蒼耳子有蒼朮一方

麻黃散

治歷節痛風無汗麻黃二錢羌活一錢半黃

潛行散

治血虛陰火痛風及腰以下濕熱注痛黃栢

四物湯問

二妙散

治濕熱痛風筋骨疼痛黃栢酒浸焙蒼朮

龍虎丹

治痛風走注或麻木身痛草烏蒼朮白芷

活絡丹

治一切痛風筋脉拘攣沉痛時或上衝川烏

五靈丸

治風冷氣血閉身麻痛五靈脂二兩川烏

神通飲

治心節風木通二兩到細長流水煎湯頓服

神效湯

治心節風木通二兩到細長流水煎湯頓服

神效湯治心節風木通二兩到細長流水煎湯頓服

豆大隨手去出汗至腰而止上體不痛矣次日
又如前煎服下體又發紅丹汗出至足而無痛後
名曰木通湯

定痛散

治風毒攻注皮膚骨節之間痛無常處畫靜
然銅血竭各七錢半虎膠骨龜板各五錢天麻槓榔
風牛膝各七錢半虎膠骨龜板各五錢天麻槓榔
羌活五加皮各二錢半右

虎骨散

治風毒攻注皮膚骨節之間痛無常處畫靜
虎骨酥炙二兩白范蛇肉一天麻防風牛膝白殭蚕
炒歸酒浸乳香桂心各一兩全蝎炙甘草炙各

加減虎骨散

治白虎節痛晝夜不止虎脛骨二兩
尤好麝香一錢右為末每二錢溫酒調下
五錢服法亦同治白虎節痛晝夜不止虎脛骨二兩

麝香元

治白虎歷節疼痛遊走無定狀如虫行畫靜
五錢黑豆生二錢半麝香一字右為末糯米糊和
丸菜豆大空心酒下七九為末糯米糊和

乳香黑虎丹

治諸風寒濕骨節疼痛立效草烏
川芎自然銅醋淬七次各二兩乳香一兩右為末
酒糊和丸梧子大百草霜為衣臨睡溫酒下五丸
或七忌食

乳香定痛丸

治遍身骨節疼痛蒼朮二兩川烏炮當歸
錢右末棗肉和九梧子大
溫酒吞下五六十九錢

捉虎丹

治一切痛風走注癱瘓木
白虎歷節及寒濕脚氣疔木
靈仙除痛飲而發動於經絡之中濕熱流注於肢節

靈仙白芷蒼朮片芥酒炒枳實桔梗葛根川芎各

五分當歸梢升麻甘草各三分右剉作

半夏芥木湯

錢陳皮赤茯苓各五分威靈仙三分甘草二分

拈痛散

良薑麻黃天麻羌活獨活細辛肉桂防風白朮

當歸散

去煩劑葉代椒葉亦佳宜

禁忌法

量與痛風諸痺皆然

破傷風病因

破傷風者多由血筋無所營故邪得以... 產後致斯病者常可見矣... 寒熱死在朝夕則口噤目斜...

破傷風形證

破傷風者筋勁強直而不柔和... 難通泄傳播經絡塞氣

太陽中風重感在寒熱則發瘧也瘧者口... 脈虛竭小兒腦風人涼濕得瘧風者皆死

緊縮而熱則弛張風則急無汗而惡寒故血弱則汗濕則惡寒緩風散氣故有
 汗而惡寒故血弱則汗濕則惡寒緩風散氣故有
 張筋濕熱不攘故為所為也原其所謂大筋短小筋弛
 無所營及產後致以斯病所以見寒汗下過多與夫
 病無所營及產後致以斯病所以見寒汗下過多與夫
 而急名曰痙風併治宜其風動而諸筋相與引夫
 屬于火熱勝風痙併治宜其風動而諸筋相與引夫
 相乘是以醫痙生矣治宜其風動而諸筋相與引夫
 熱可立愈若妄加艾火發其表則熱不折其風火皆
 破傷風脈沉弦緊之緊如弦直上或沉細些江後欲解
 力太發如蛇長而有力可伏堅也傷浮而細小少陽也
 出○凡瘡外者立死○散
 破傷風治法
 瘡是時瘡無汁者中風也邊自出黃水者中風也
 瘡是時瘡無汁者中風也邊自出黃水者中風也

破傷風治法

破傷風脈

破傷風治法
 瘡是時瘡無汁者中風也邊自出黃水者中風也
 瘡是時瘡無汁者中風也邊自出黃水者中風也

欲初覺瘡腫起又痛不在瘡處者傷經絡亦死
 也初覺瘡腫起又痛不在瘡處者傷經絡亦死
 若在頭面急用水調膏和雄黃付瘡上腫漸消急用
 若腰脊反張四肢強直沫立通身冷按不摩導急用
 蜈蚣細末擦背反張速灌小續命湯宜冷按不摩導急用
 筋沉細手足戰搖伸縮者是痰瘧若身冷手足冷
 生痰脈滑數名陰為痰疾宜速灸瘡破小傷風枳實湯不可
 全用藥散氣死之速矣瘡破小傷風枳實湯不可
 辛以散之在裏防風通下散之兼散破傷風如表則
 禁血祛逐邪煎水調全防風末活之類各一後通利
 大黃各二錢煎水調全防風末活之類各一後通利
 阿膠○破傷風多死宜用全防風末活之類各一後通利
 妙○破傷風多死宜用全防風末活之類各一後通利
 烏蛇散○破傷風多死宜用全防風末活之類各一後通利
 烏蛇散○破傷風多死宜用全防風末活之類各一後通利
 大凡散○破傷風多死宜用全防風末活之類各一後通利
 身體及四肢則以防風為白芷隨身稍用在頭下則在

身大鵝烏全妙阿大禁辛全生脉筋○蜈若

以獨活佐之研○諸瘡欲變宜急風散防風散
發汗多成瘡宜防風當歸散亡血多成瘡宜當歸
湯地黃

玉真散

治破傷風口噤身強直防風天南星等分
末每二錢薑汁和溫酒調服以滓付瘡口上

水調膏

治破傷風發熱紅腫邪欲傳經絡而未深
入者杏仁研為泥白麩等分新汲水調成膏

參歸養榮湯

治風痰陰痿人參當歸川芎白芍藥
熟地黃白朮茯苓陳皮各一錢甘草

瓜蒌枳實湯

治痰火疰瓜蒌仁枳實貝母桔梗片苓
陳皮枳實貝母枳實貝母枳實貝母

全蝎散

治破傷風口噤肢體反張頭更欲死蝎梢
七箇為末熟酒調服日三凡患破傷風非此

大蜈蚣散

治破傷風抽搐各五錢轉入裏常服左龍丸
風煎湯調服此不覺轉入裏常服左龍丸

二烏丸

治破傷風角弓反張牙關緊急主川烏白芷
天麻各二錢生草烏雄黃各一錢右為末酒

烏蛇散

治破傷風痰盛烏蛇六錢麻黃一兩草烏炮
乾薑附子炮川芎白附子天麻各五錢蝎梢

錢熱酒調日三服

三十三

朱砂指甲散 治破傷風手足戰掉不已朱砂水飛天

烏鴉散 治破傷風血凝昏問烏鴉翎燒灰酒調

香膠散 治破傷風口噤身強直魚膠燒十分留性麝

一字散 治破傷風急者金頭蜈蚣一錢一條為末每一字

退風散 治破傷風不省人事防風天麻白芷麻黃赤

急風散 治久新諸瘡傳變為破傷風麝香一字朱砂

防風當歸散 治發汗過多成症防風當歸川芎生地

當歸地黃湯 治亡血過多變成破傷風宜養血當歸

破傷風之治同傷寒三法 裏破傷風有不在表在裏半表半

下和法也 強頭搖口噤背反張者太陽症也 引肘膝相構者少

汗宜止之 若頭低視下手足牽引一肘膝相構者少

陽症也 若目或左右視并一身前搖者陽明也

兩傍搖者少陽也 兩傍搖者少陽也

下少陽和若論三陽而不論三陰者蓋傳入有也

經其證已危若腹滿而不利口燥咽乾舌卷卵縮皆

以辛熱發散之宜防風湯在表半裏以辛涼和解

本草綱目卷之...

三十一

之宜羌麻湯防風通聖散坊見在裏則以寒藥下
之宜小芎黃湯大芎黃湯左龍丸
宜發汗若自汗多則宜
用白朮湯白朮防風湯

防風湯獨治破傷風在表未入裏急服此藥防風羌活
調之小蜈蚣散

羌活防風湯治破傷風初傳在表羌活防風川芎白
各五分右剉作

羌麻湯治破傷風在平表半裏無汗羌活麻黃甘菊
蔓荆子甘草各七分白芷薄荷各五分

小芎黃湯治破傷風入裏猶有表熱川芎三錢黃芩
服後用大芎黃湯

大芎黃湯治破傷風入裏二便秘小便赤自汗不止
之一貼水煎服以下

左龍丸治破傷風入裏發搐目直視二便秘白蠶
各五錢雄黃一錢蜈蚣二條天麻二錢右為末分

白朮湯治破傷風大汗不止麻黃芍藥各一錢甘草五
下至便利為度只服半錢九二服加二九温酒吞

白朮防風湯治破傷風發汗過多自汗不止防風四
貼分右剉作

白朮防風湯治破傷風發汗過多自汗不止防風四
貼分右剉作

痲有剉柔二證

痲證眼熱口手足傷寒但脈沉遲或大發濕家

痲終日不醒為異因傷寒發汗過多或大發濕家

痲皆作痲風性動故為痲元有汗為痲性發故為

剉柔二症並可與小續命湯以元有汗為痲性發故為

熱減半桂枝附子湯去黃芩以元有汗為痲性發故為

痲與痲相似而實不同又不可作風治

痲與痲相似而實不同又不可作風治

痲與痲相似而實不同又不可作風治

破傷風凶證

破傷風凶證痲病有灸瘡難治者宜服參芩歸竹瀝之類

破傷風凶證痲病有灸瘡難治者宜服參芩歸竹瀝之類

額上有汗珠不流三者眼小則發熱腹者身上汗出

單方

單方九開張不浮如額

石灰

石灰右治中風左眼

菖蒲

菖蒲浸酒或十種風

甘菊

甘菊浸酒或十種風

白木

白木治一切風及癩

獨活

獨活治下風

炒熟投酒中蓋定良久取溫服之

五月五日午時地取葉耳葉洗曝
燥搗末酒蒸服一升日三考吐
蜜丸服十九風輕易治者日再服或作
煎丸出如麻豆粒者以鐵刺潰去之

防風 六分 頭身梢治上中下部風邪
○治三
十

蒼耳子 治一切風氣及風濕
○取子三兩為末水煎服

仙靈脾 治中風半身不遂
○取一斤對袋煎服

藁本 治風痺癱瘓不遂
○其苗名定風草

天麻 治諸風痺癱瘓不遂
○動其苗名定風草

草麻子 治中風口眼喎斜
○取子去殼搗爛右嚼塗左

稀莖 治中風久百醫不差
○五月五日摘其葉嫩枝酒

松葉 治中風筋骨強健
○髮白更黑則眼

黃松節 治偏風口眼喎斜
○毒風筋攣

五加皮 治風補虛
○又治風痺

桑枝 治風氣
○霜後葉煮湯

竹瀝 治中風口喎
○不語煩悶

皂莢 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

鱧魚 治中風口喎
○不省為末醋調

松節酒治歷節風四肢疼痛由如
解法○松節三斤楮椒葉三
十斤碎剉各用木四石煮取一石石
三味澄清合漬乳麴五升候蒸
以糯米四石五斗釀之依家醞法
四釀勿令傷冷第一酸時下後
諸藥○柏子仁天雄草薤川
芎各五兩秦菴六兩人參茵芋
各四兩防風十兩磁石十兩末
獨活十兩

蜈蚣 治細末破傷風口噤身冷強直 立效 蜈蚣

蟻 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

立效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

將效 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

風出 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

破傷風 治一破傷風極有神效 初覺急取糞堆內蟻 蟻

葱白 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

黑豆 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

梨 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

杏仁 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

白花蛇 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

蚕沙 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

烏雞 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

野鴿糞 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

薄荷 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

烏雞 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

鴈肪 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

烏鴉 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

熊脂 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

虎骨 治一切風濕 煎取汁飲之 日三服

肝中風者其人但踞坐不得低頭
純面目連額上色微青者肝風
之證也若唇色青面黃尚可治急
灸肝膈百壯服續命湯若大青黑
面一黃一白者此為肝已傷不可復
治數日而死
肺中風者其人偃卧而胃滿短氣
冒汗汗出者肺風之證也視目下
黃而暈下行至口色白者尚可
治急灸肺膈百壯服續命湯
心風者其人但得偃卧不傾側則
亂息絕汗出者心風之證也若唇正
赤尚可治急灸心膈百壯服續命湯
若唇或青或白或黃或赤者此為心已
壞為水面目青時快動者不可復治
三六日死
脾中風者其人但踞坐而腹滿身通
黃汗者尚治急灸脾膈百壯

服續命湯者目下青手足青者不可
復治
腎中風者其人踞坐而腰痛視腸左右
未有黃色如餅菜大者尚可治急灸
腎膈百壯服續命湯若齒黃赤者
髮直面色者不可復治
入腸中風者其人則而腸鳴不止灸大腸
膈百壯可服續命湯

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲
死急灸足大趾下橫紋隨年壯
立愈

鹿生肉

治中風去風之骨釀酒肉和生補虛同禱之
則去風之功如續命湯之類然此因扶道不病若
欲要收全功火艾為良而中風皆因脈道不通
氣閉塞也灸則喚醒脈道而血氣得通故可收全
功也
氣海關元二風痰盛聲如曳而足脛上及手食指危
證亦宜灸之
指絕骨各三壯春秋報灸常令兩脚有灸急指危
里絕骨各三壯春秋報灸常令兩脚有灸急指危
日風入截故也此病者不可忽然卒死是謂何病
或麻痺痛曲久乃已此將絕骨中府之候宜灸百會
曲麻痺痛曲久乃已此將絕骨中府之候宜灸百會
亂神思不怡或手足麻痺此將絕骨中府之候宜灸百會
百會風池大頰有井曲池問此將絕骨中府之候宜灸百會
加有風池合谷有井曲池問此將絕骨中府之候宜灸百會
之卒中風合谷有井曲池問此將絕骨中府之候宜灸百會
百會肩髃曲池風市三里絕骨耳前髮際大頰風倉

大理道卿患風腫脚不隨不能跪起鐵上帝一穴環跳一穴
湯陵泉一穴巨虛下廉一穴凡鐵四穴即能跪起

池几十二穴轉中風目戴上下不能視灸第二
骨第五頰骨上各七壯地倉又法向右者灸左
嗚斜宜灸聽會頰石會頰會風池有聾中曲池合谷
陪中鳴向左右者二石會頰會風池有聾中曲池合谷
半身不遂宜灸絕骨會頰會風池有聾中曲池合谷
承漿合谷翳風神門支溝風府失音不語宜灸環
人中天突涌泉神門支溝風府失音不語宜灸環
跳為要穴中衝與關衝與中衝與關衝與中衝與關衝
陰與涌泉中衝與關衝與中衝與關衝與中衝與關衝
厲兌與隱白少衝與隱白少衝與隱白少衝與隱白少
商與陽明白少衝與隱白少衝與隱白少衝與隱白少
中衝與關衝與中衝與關衝與中衝與關衝與中衝與關衝
謙南治趙僧判中藏刺十敦二凡此十愈二經井陰與涌泉
取大衝陽二井穴愈二敦二凡此十愈二經井陰與涌泉
里皮痺取大衝陽二井穴愈二敦二凡此十愈二經井陰與涌泉
為數以痛取大衝陽二井穴愈二敦二凡此十愈二經井陰與涌泉
穴非取諸經之壯穴也
於痛處灸三七壯亦佳
針治百節廢亦實無所知

大羌活湯

解利兩感傷寒或傷寒見風脈傷風見寒
知母川芎各一分錢羌活防風獨活等證生地黃連
蒼朮白朮各七分細辛甘草各五分右剉作一貼
水煎服未解再服三四貼宜服此
方治陰陽已分傷寒者宜服此

陶氏中和湯

活蒼朮防風川芎生地黃芩柴胡乾
葛白芷石膏各一錢細辛甘草三七粒同煎服
貼入薑三片棗二枚黑豆三七粒同煎服
名冲和靈

脉法

凡治傷寒以脉為先以證為後以治為先以證為後凡治雜病以證為
先以脉為後以治為先以證為後凡治雜病以證為
見脉未傷寒之脉陰陽俱盛而脈微此名傷寒也凡傷寒者脉必微也
寒動滑此傷寒也沉瀉為微此名傷寒也凡傷寒者脉必微也
數動滑此傷寒也沉瀉為微此名傷寒也凡傷寒者脉必微也
浮洪細小徒費神功汗後脉靜當便瘥喘熱脉
見洪細小徒費神功汗後脉靜當便瘥喘熱脉

傷寒變熱

亂命應終辨寒傷太陽浮而濇及傳沉必兼
狀難悉明辨寒傷太陽浮而濇及傳沉必兼
及入少陰其脉遂厥厥陰熱甚脉伏厥冷在陽
法之正利小大便溲解裏病其脉甚實此其大略治
端陰陽俱盛於大瀉者有仲景而滑陰濡而急此非
傷風勿用寒藥○陽浮滑陰而弱陰小或遇於風寒
乃濕温脉○陽浮滑陰而弱陰小或遇於風寒
風温脉濡弱陰脈數弦脈實大更遇温熱變成温毒
盛病俱熱之極當無汗而有汗傷之命脈虛而微寒熱俱
陰陽俱盛大忌沉細醫○中寒之脈春○傷寒熱病
脉宜洪大忌沉細醫○中寒之脈春○傷寒熱病
生熱也○寒氣外凝於陽而傳為熱何也曰夫寒盛則
生則氣不宣通封則濕氣內鬱結中外相綴六府閉封
生故人傷於寒轉而為熱也汗之而愈則外
寒內鬱之理可知矣乃雜病數日而愈則外

傷寒傳經

傷寒傳經內經曰太陽者諸陽之屬也其脈連於風府
熱其狀甚不為諸陽主氣也諸陽之傷也其脈連於風府
聞其狀甚不為諸陽主氣也諸陽之傷也其脈連於風府
脊強二日陽明受之陽明主肉也三日少陽受之少陽主筋
故身熱日甚脈循兩脇未入於耳故胸脇痛而耳聾受之
陽主筋其脈循兩脇未入於耳故胸脇痛而耳聾受之
經絡皆受其病而末入於耳故胸脇痛而耳聾受之
陰受之太陰脈布胃中絡於膈故可胸脇痛而耳聾受之
日少陰受之少陰脈貫腎絡於膈故可胸脇痛而耳聾受之
舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循膈故可胸脇痛而耳聾受之
肝故煩滿而囊縮三陰受之厥陰脈循膈故可胸脇痛而耳聾受之
衛行五藏而囊縮三陰受之厥陰脈循膈故可胸脇痛而耳聾受之
日巨陽病衰頭暈少愈八日其病兩感於寒者七
九日思飲食十日耳聾少愈十日其病兩感於寒者七
故則思飲食十日耳聾少愈十日其病兩感於寒者七
而病已矣二日厥陰受之厥陰脈貫腎絡於膈故可胸脇痛而耳聾受之
病日已矣二日厥陰受之厥陰脈貫腎絡於膈故可胸脇痛而耳聾受之
若謂此也大便氣皆去則病入精神爽慧也人活景也

傷寒或愈或死日期

傷寒或愈或死日期黃帝曰今夫熱病者皆傷寒之類
間其愈皆以十日已上者何也其死皆以六七日其
故岐伯對曰兩感於寒而病者到六七日解願聞其
帝曰兩感者三日當死而六日乃死何也岐伯曰
陽明者十二經脈之長也其氣不兩感於寒者到十二
日其氣乃盡故死矣其長也其氣不兩感於寒者到十二
六經再傳故愈矣納

傷寒大法

傷寒大法傷寒即病者有四曰傳經曰專經曰
寒邪之中人無有定體或中於陽或在於陰或不
中於太陽未及鬱熱而愈或有從太陽者未及鬱
傳變者宜發散表邪而愈或有三陰之經而病者
不從陽明少陽而直傷於三陰之經而病者亦宜
曾入於陽經而直傷於三陰之經而病者亦宜
中通於陽經而直傷於三陰之經而病者亦宜
陽明少陽而直傷於三陰之經而病者亦宜
經者則為傳經之熱證明矣

太陽六傳 太陽者巨陽也為三陽之首膀胱經病若渴

名曰經也。太陽傳為發汗不盡利小便餘邪不盡透入

于裏也。○太陽傳少陽膽木者名曰越經傳為元

受病也。浮無汗宜用麻黃湯而不用故也。○太陽

傳太陽桂枝而反者名曰表病當腹為痛四肢急當汗

而反不汗不發所以傳裏也。○太陽傳厥陰與督脈上行與太陽

者為三陰不至於首惟厥陰與督脈上行與太陽

相接名曰經。相得度傳。經得度傳。經得度傳。經得度傳。

六經標本 經絡為標。膀胱為本。餘如太陽

太陽形證用藥 太陽病發熱惡寒身重不可轉側

月九味羌活湯。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

熱在皮膚則頭項強直。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

發熱惡寒身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

太陽傷風 太陽傷風者汗自出。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

太陽傷寒 太陽傷寒者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

太陽兩傷風寒 太陽兩傷風寒者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

太陽病似瘧 太陽病似瘧者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

多寒少汗 多寒少汗者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

更下更吐 更下更吐者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

不能得小汗 不能得小汗者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

身重不可轉側 身重不可轉側者身重不可轉側。○太陽病發熱惡寒身重不可轉側

太陽畜血

太陽病六七日表證因在脈微而沉反不
小便自利者下血乃愈抵當湯主之
俱在而脈反沉兼發狂小腹痛者宜用此藥防見證

麻黃桂枝湯

桂枝湯發熱惡寒往來如瘧狀
一錢五分杏仁八分芍藥二錢甘草一錢
入薑五片水煎服

九味羌活湯

無汗惡寒身重關節痛發熱惡寒
則其變不可勝言故立此法使不得服桂枝湯
鮮表神方羌活防風各一錢細辛甘草蒼朮白朮黃芩
一貼入生薑三片大棗二枚芍藥二錢
○一貼入生薑三片大棗二枚芍藥二錢
撥亂反正之主也防風治一身盡痛聽軍將命乃
而緩裏急和諸藥行氣能除濕氣下安太陰
草少陰心熱在內黃芩治太陰肺熱在胃白芷治
治少陰心熱在內黃芩治太陰肺熱在胃白芷治

桂枝湯

陽明頭痛在額細辛治
少陰腎經苦頭痛
二錢甘草一錢白芍藥一錢桂枝三錢
湯入飴糖二匙熟川芎羌活桑葉本薑棗煎
熟入飴糖二匙熟川芎羌活桑葉本薑棗煎

麻黃湯

治太陽傷寒頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛
麻黃三錢桂枝二錢甘草一錢杏仁十枚
剉作一貼入薑五片水煎服

大青龍湯

善解風寒兩傷麻黃三錢桂枝二錢杏仁十枚
入薑三片棗二枚水煎服
發熱惡風煩躁手足溫傷風脈熱少煩躁見風脈也蓋
為傷寒候脈浮緩為傷風脈熱少煩躁見風脈也蓋

脉之似桂枝反仲景治傷寒似麻黃反桂枝二則麻黃三則
主龍桂枝風傷三首如鼎立予嘗深究三旨若證
脉傷寒見風脉三首如鼎立予嘗深究三旨若證
候與脉相對則無
不應手而愈

桂婢各半湯 治太陽病微身不痒石膏二錢桂枝
貼入生薑三片大棗

桂麻各半湯 治太陽病微身痒麻黃一錢半桂枝
二枚水煎溫服

陽明形證用藥 寒陽明者大腸為標與肺為表裏故微惡
汗者宜白虎湯胃承氣湯為小月陽明以肌肉之間為表
胃府為裏熱在表則目疼不眠宜葛根湯
肌湯熱入裏則狂譫宜調胃承氣湯

陽明病有三 病有太陽陽明者脾約是也
正陽中燥煩實大便難是也少陽明者發汗利小便
便胃中煩實大便難是也少陽明者發汗利小便
家實也問曰緣何得津液胃中乾燥因轉屬陽明
下若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明
不更衣內實大便難是也少陽明者發汗利小便
者此名陽明病也

陽明病陰陽結 曰陽浮而數能食不大便者此為實名
不能食身重大便難也
陰結也
陽明外證 反惡熱也
微汗出也
多者急下之宜大承氣湯
陽明證潮熱 詳見
陽明證譫語 詳見

陽明證譫語 詳見

更清實錄卷之三

四十五

陽明病惡候

如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床揚而不
安微喘直視承氣湯者生一瀉者利大便後發潮熱五六日
熱語宜大承氣湯者生一瀉者利大便後發潮熱五六日
發潮熱手足衣雖有兩證而無法但視急者皆走
此誠惡候仲景雖有兩證而無法但視急者皆走
瀉者死且救之與小承氣湯一服而大便利者皆走
疾漸退且微弦半愈或問曰脈弦者大便利也
在玉函列於陽明部蓋陽明及拾物者肝熱也此證
于胃經故以承氣瀉之且得理也
肝平而胃不受剋此瀉之且得理也

陽明實證宜下

數自汗出大便燥小便秘在胃中調胃承
氣湯下之治○手足濇然汗出者此大便秘已鞭
也謔語有潮熱承氣湯下之汗出者此大便秘已鞭
陽明虛證宜補湯反劇以參芪歸木陳皮甘草煎湯

陽明證汗渴

中外俱熱言上乾燥而煩渴亦宜此藥○汗下後表裏
俱熱言上乾燥而煩渴亦宜此藥○汗下後表裏
之○汗者不可解脈浮者蒼木白虎湯主之○無
汗而渴者不可解脈浮者蒼木白虎湯主之○無
下妙見

陽明三證

陽明三證水泄下焦熱小便利是乃三焦俱熱渴欲飲
熱邪從小便而渴者不可用猪苓
湯惟汗多而渴者不可用猪苓
陽明脾約證數浮瀉相轉大便難其脾為約小仁

陽明脾約證

數浮瀉相轉大便難其脾為約小仁

東醫寶鑑卷之二

四十五

陽明病禁忌
證不可攻也
胃氣虛冷不能食
攻其熱必噦
所以然者
表者先宜用桂枝
柴胡和之
此為解之
乃可下也
○陽明大便
病口燥
但

葛根解肌湯
治陽明地黃湯
別不
方
○內竭
明大便
病口燥
但

白虎湯
治陽明病
○煎服
○草五分
右芍藥
葛根
一貼
入薑

猪苓湯
治陽明證
○膠澤
○利
○石
○谷
○一
○錢
○右
○四
○味
○刺
○水
○煎

少陽形證用藥
少陽之苦
舌乾者
屬少陽
○乾目眩
○脈乾
○脈俱往

少陽證為半表半裏
陽明禁利
○小柴胡湯
○表多則小柴胡湯
○陽惡寒陽明自汗
○傷寒脈弦
○細頭痛發熱者
○屬少

少陽病不可發汗
傷寒脈弦
○細頭痛發熱者
○屬少

少陽證往來寒熱
相搏結於脇下
○邪正分爭
○往來寒

熱休作無時不欲飲食
○嘔宜用小柴胡湯

東醫圖書集成
卷之...

...

...

...

少陽病壞證 太陽病不能食 往來寒熱 尚未吐下 脈沉緊

少陽病脇痛 少陽證 壞病 依壞法 治之 謂之 謂

和也 宜十棗湯 若合下 不下 則令入 脹滿 身浮

小柴胡湯 治少陽病 半表半裏 往來寒熱 能和其內

黃芩湯 治少陽病 嘔吐 腹脹 泄利 渴 口苦 舌乾 渴

十棗湯 治傷寒 有懸飲 伏飲 脇下 引痛 芫花 微炒 甘

黃芩湯 治少陽病 嘔吐 腹脹 泄利 渴 口苦 舌乾 渴

太陰形證用藥 甚太陰之為病 然有不可輕用 暄結

身目黃 腹滿 身重 難轉側 腹脹 大便不利 小便不利

者茵陳蒿湯 為本 故腹自滿 痛 屬大柴胡湯 宜理中

○太陰證 亦主之 剝不渴 宜理中 痛 復如故 此虛寒

宜大承氣湯 逆之 見理中 腹滿 時痛 復如故 此虛寒

從下而上 也當以溫藥 和之 宜理中 痛 復如故 此虛寒

不節寒中 陰傷 腹滿 閉塞 唇青 手足 逆湯 以脈沉細 宜

其藏有寒 故也 當溫之 宜用 四逆湯 以脈沉細 宜

太陰病腹痛傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先

太陰病腹脹滿桂枝湯加芍藥反下之因腹滿時痛者屬太陰

太陰病發黃傷寒七八日身黃如橘子色小便不利

理中湯治太陰腹痛自利不渴入參白朮乾薑炮各

理中丸治同上以理中湯材作末蜜丸

四順理中湯治腹痛自利即理中湯倍甘

治中湯治太陰腹痛等分也

厚朴半夏湯治傷寒發汗後腹脹滿厚朴三錢入參

芒蘆蒿湯治太陰證發黃茵陳蒿一兩大黃五錢

少陰形證用藥利病但欲寐也

之醫下... 雜病篇二

四一七

少陰病伏氣咽痛

散○邪熱入深則手足漸冷此熱厥也... 欲絕或脈伏宜四逆湯... 服四逆湯... 欲絕或脈伏宜四逆湯... 服四逆湯... 欲絕或脈伏宜四逆湯... 服四逆湯...

少陰病禁忌

○少陰病下利咽痛不可與甘草湯... 痛宜少陰病散... 其血未可知... 薑附湯... 防白通湯... 目其血未可知... 薑附湯... 防白通湯...

麻黃附子細辛湯

治少陰病但欲寐... 一貼水煎服... 少陰病始得... 宜溫劑發汗... 麻黃附子甘草湯... 治少陰病... 宜溫劑發汗... 麻黃附子甘草湯...

附子湯

治少陰病... 參各二錢... 二貼水煎... 附子湯... 治少陰病... 參各二錢... 二貼水煎... 附子湯...

黃連阿膠湯

治少陰病... 黃連一錢... 阿膠一錢... 黃連阿膠湯... 治少陰病... 黃連一錢... 阿膠一錢... 黃連阿膠湯...

本草綱目卷之...

五十一

四逆湯 治傷寒陰證要藥也凡三陰脈遲身痛並用

子生一水煎服右對分

通脉四逆湯 治少陰病下利四肢厥冷脈微欲絕或

錢右對作一貼水煎服

逆湯入葱白三升半煎服

白通湯 治少陰病下利脈微乾薑三錢附子生半箇

童尿一合猪膽汁半枚煎服

赤石脂禹餘糧湯 治少陰證下利不止當治下焦宜

煎服

桃花湯 治少陰病下利膿血赤石脂五錢半生半

一別入赤石脂細末

真武湯 治少陰病腹痛各三錢白朮二錢右剉作一貼

武入薑後世避諱改為真武湯

白頭翁湯 治少陰病下利欲飲水以有熱故也宜用

作一貼後重而渴

三黃熟艾湯 治傷寒大下熱利不止黃芩黃連黃蘗

薤白湯 治傷寒下利如爛肉一握赤帶七枚右剉水

升半先煎至一升二合分二服

四逆散 治傷寒病手足自熱而溫從溫而至

各等分調服日二服

猪膚湯 治少陰客熱咽痛猪膚一兩水一盞煎至五

甘草湯 治少陰客熱咽痛白粉益氣斷利

桔梗湯 治少陰客熱咽痛水煎服

半夏散 治少陰客熱咽痛水煎服

厥陰形證用藥 厥陰心包絡三味參黃芩四順湯主之

麻黃入腹宜承氣湯下之 俱大抵傷寒病藏府傳

厥陰病煩滿囊縮 厥陰微欲絕宜當歸小腹痛煩滿囊

厥陰病手足厥冷 厥陰手足厥冷是也

厥陰病手足厥熱 厥陰手足厥熱是也

厥陰病手足厥微 厥陰手足厥微是也

傷寒六七日尺寸脈微緩者厥陰受病也其

三味參黃湯

治厥陰煩燥欲嘔吐明食穀欲嘔者皆妙

吳茱萸三錢入參二錢生薑四片大棗二枚右剉水煎溫服

當歸四逆湯

治厥陰各二錢手足厥冷脈微欲絕當歸白

草各一錢右剉水煎服

傷寒陽證

凡仲景稱太陽病者皆表證發熱惡寒頭項

不可與證相應則不可發汗但用一各半湯和之

而無身熱若身熱而脈滑又頭痛屬陽證無疑矣

此為表寒裏熱屬陽證宜陽旦湯

冬月麻黃湯桂枝湯虛者人參順氣散

羌活芍藥和湯散入參羌活散

癩方

陽旦湯

治傷寒陽證身大熱反欲近衣桂枝藥

薑三片棗二枚水煎服

傷寒陰證

凡傷寒四肢厥冷吐利不渴靜謐此陰證之

脈便是不可伏陰急與五積散加附子如重按無力是陽

證也傷寒微者寒邪外襲漸入經絡宜初起無頭細

身熱便惡寒厥冷或胃腹中痛吐利太陰用附

子理中湯少陰用附子湯厥陰用當歸四逆湯

○傷寒有口沃白沫或苦多流冷傷寒陰證宜

吳茱萸湯理中湯切忌冷藥

旦勿人參養胃湯藿香三氣散不換金正

氣散正陽散○陰證似陽面赤而脈微

五積散治感傷風寒或內傷身冷外感風冷並皆主之

嘔吐泄瀉或內傷身冷外感風冷並皆主之

乾薑白芍藥白茯苓各一分

蒼朮二錢麻黃陳皮各一錢厚朴桂枝枳殼當歸

各七分甘草六分右剉作一貼入薑三片蔥白三

薑水煎服之○一方除白芷肉桂餘材浸火炒令

辛黃三白湯

治陰證傷寒在表經者人參白朮白芍藥各二錢

黃各五分右剉作一貼入薑三片

陰旦湯

治陰證傷寒身大熱欲近衣此為內寒外熱也桂枝二錢黃芩乾薑各一錢半芍藥甘草

人參養胃湯

治傷寒陰證及外傷風寒內傷生冷憎

寒壯熱頭痛身疼蒼朮一錢半陳皮厚朴半夏製各一錢二分半茯苓藿香各一錢入參

草果甘草炙各五分右剉作一貼入薑三片棗二

枚烏梅一箇水煎服之蘇飲款款調之○然

藿香正氣散

治傷寒陰證頭身疼痛如不分表裏證以此導引經絡不致變動藿香一錢半

紫蘇葉一錢白芷大腹皮白茯苓厚朴白朮陳皮半夏製各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚

水煎服之

不換金正氣散

治傷寒陰證頭痛身疼或寒熱往來

各一錢右剉作一貼入薑三片

正陽散

治陰證傷寒附子炮半錢半陳皮大黃生乾薑

肉桂芍藥各一分右剉作一貼入薑三片

傷寒表證

凡傷寒初得病二三日頭痛身熱惡寒表

證發熱惡寒頭項痛也○凡仲景稱太陽病者皆表

脈浮者表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

汗之○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

鳥不能飛騰動先伸引其頭也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也○凡為太陽表證也

之一云無翅鳥欲飛貌。○傷寒表證通用麻黃
杏仁飲寒傷榮宜麻黃湯。○傷寒表證宜桂枝湯。三時
發表宜九味羌活湯。○表證宜香蘇散。○香蘇散
人參敗毒散。香葛湯。○表證宜香蘇散。○香蘇散
小龍湯。神木散。消風散。○表證宜香蘇散。○香蘇散
活冲和湯。有汗宜防風冲和湯。○表證宜香蘇散。○香蘇散
散雙河解

麻黃杏仁飲 治傷寒太陽經發熱惡寒頭痛無汗脈
各一錢杏仁細辛各八分防風七分甘草
四分右剉作一貼入生薑三片水煎服

香蘇散 治四時傷寒頭痛身疼發熱惡寒及傷風傷
木一錢半陳皮一錢甘草五分右剉
作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

芎芷香蘇散 治傷寒頭痛寒熱無汗香附子紫蘇葉
木一錢半陳皮一錢甘草五分右剉
右剉作一貼入薑三片白芷各一錢甘草五分

十神湯 治兩感風寒頭痛寒熱無汗香附子紫蘇葉
各一錢右剉作一貼入薑三片水煎服

人參敗毒散 治傷寒時氣發熱頭痛項強肢體煩疼
前胡枳殼桔梗梗川芎赤茯苓人參甘草各一錢右
剉作一貼入薑三片水煎服

香葛湯 治傷寒不問陰陽兩感頭痛寒熱蒼木紫蘇
葉白芷甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服

蔥白散 治四時傷寒傷風頭痛體熱煩渴麻黃二錢
蒼木白木水川芎各一錢半石膏乾葛甘草各
七分半右剉作一貼入薑三片水煎服

參蘇飲 治感冒風寒頭痛發熱咳嗽及內因七情痰
盛胃滿潮熱人參紫蘇葉前胡半夏乾葛赤

東醫圖書集成卷一百一十一

五十一

茯苓各一錢陳皮桔梗枳殼甘草各七分半
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

小青龍湯

治傷寒喘咳不絕因心下有水氣乾嘔氣逆發熱咳喘麻黃芍藥五味子半夏製各一錢半細辛乾薑桂枝甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服此渴者裏氣溫水欲散也

神木散

治傷寒傷風頭痛體疼惡寒無汗蒼木二錢一貼入薑三片蔥白二莖水煎服

消風百解散

治感傷風寒頭痛身疼鼻塞聲重荆芥蒼木白芷陳皮麻黃各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片

雙解散

治傷寒表裏不解滑石三錢甘草一錢石膏黃芩桔梗各七分防風川芎當歸赤芍藥大黃麻黃薄荷連翹芒硝荆芥白朮梔子各五分右剉作一貼入薑三片

方乃益元散與防風通聖散發表兩得其宜也
元散通裏通聖散發表兩得其宜也

傷寒裏證

傷寒裏證法而己下之陽熱汗出不惡寒反惡熱下之一

明裏證也宜下之陽熱汗出不惡寒反惡熱下之一
潮熱譫語承氣湯下之陽熱汗出不惡寒反惡熱下之一
六七有燥屎可攻若不轉氣少者無燥屎慎不可
攻也若攻之必脹滿不能食也發熱汗出不惡寒反惡熱下之一
寒反惡熱者屬裏即陽明證也發熱汗出不惡寒反惡熱下之一
惡熱者胃實也宜調胃承氣湯也發熱汗出不惡寒反惡熱下之一
氣攻熱邪傳裏也宜調胃承氣湯也發熱汗出不惡寒反惡熱下之一
之調胃承氣又次之柴胡湯又次之柴胡小承氣承
急下之宜大承氣湯和胃氣如邪未深恐有燥屎小腹痛
宜下之宜大承氣湯和胃氣如邪未深恐有燥屎小腹痛
者當和胃氣調胃承氣勿令大泄如不惡寒但腹實
差承氣則無生之有者遺之候令調胃承氣證不可
大承氣則愈後元氣不復以其氣藥犯之若大承
氣證用調胃承氣則愈後神氣不清以其無氣藥
也小承氣湯證用大承氣則愈後神氣不清以其無氣藥
後入合三藥為一方號為三一承氣殊失仲景本

意聊○裏證宜下通用三一承
氣湯六一順氣湯陶氏黃龍湯

小承氣湯 治傷寒裏證小熱小實小滿宜緩下者用
此大黃四錢厚朴枳實各一錢半右剉作

煎服貼水

大承氣湯 治傷寒裏證大熱大實大滿宜急下者用
此大黃四錢厚朴枳實芒硝各二錢右剉

作一貼水二大蓋先煎枳實一煎至一蓋乃下
大黃煎至七分去渣入枳實一煎溫服

調胃承氣湯 治傷寒裏證大便硬小便秘赤譫語潮熱
大黃四錢芒硝二錢甘草半斤右剉作

一貼先煎大黃甘草至半去渣入芒硝再一沸溫
服○三承氣須分三焦受病而用之若三焦傷

者痞滿燥實堅俱全是用大承氣大黃瀉熱有痞
瀉實厚朴消痞芒硝潤燥軟堅若上焦傷者有痞

滿實而無燥堅是用小承氣厚朴消痞枳實瀉滿
大黃瀉熱若中焦傷者無痞滿而有燥實堅是用

調胃承氣甘草和中而已

大柴胡湯 治傷寒病以陽轉屬陽身熱不惡寒反
惡熱大便秘結小柴胡湯加芍藥枳實二錢半

四錢黃芩芍藥各二錢半大黃二錢枳實一錢半

半夏一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

下痞問也○柴胡去入參甘草加芍藥大黃去地道不通

三一承氣湯 治傷寒雜病入裏之深大小便不通者
甘草三錢大黃厚朴枳實芒硝各一錢

半右剉作一貼入薑三片煎服至

六一順氣湯 治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾
語謇發狂潮熱自汗胃脘滿痛等證以

代大小調胃三錢承氣大柴胡大陷胸等湯之神

煎至半去渣入鐵錢水三匙調服

陶氏黃龍湯 治熱邪傳裏胃中燥糞結實心下硬痛
純下清水八錢芒硝一錢半枳實

巨唐寶益准方第

五

厚朴各一錢 人參當歸甘草 煎溫服 右列

傷寒半表半裏證

後為太陽身而為陽明也 柴胡湯主之 少陽中寒熱之半表裏也 以
身之前後而言也 小柴胡湯主之 少陽中寒熱之半表裏也 以
勝寒熱五苓散分利膀胱之水 則寒燥多則熱亦往
來寒熱不定 上下之半表裏也 陽證也 陽證也 陽證也
吐瀉屬半表半裏 即少陽也 陽證也 陽證也 陽證也
痛者屬半表半裏 即少陽也 陽證也 陽證也 陽證也
汗裏證當汗下 不易之法也 然而假令脈浮而大 是
表證當汗下 又發熱煩渴 小便赤 却當下此表裏俱
見雙解散主之 陽明○假令在裏因在表 須當發汗
此兩證俱見 宜桂枝湯○假令在裏因在表 須當發汗
食大便硬 脈沉數 是裏證 當下之 假令在裏因在表 須當發汗
手足冷 却當汗下 此半在表半在裏 在裏之證表者或脈浮或頭
欲汗則惡風或惡寒裏者或譫妄語或揚手擲足

傷寒陰厥

湯上工且傷寒須分表裏 若表裏不分 汗下差謬 豈
為上工且傷寒須分表裏 若表裏不分 汗下差謬 豈
胡加桂枝均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
參主之 均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
水小青龍湯主之 身涼表證罷 咳而喘下痛為裏
於陽也 麻黃湯主之 均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
於陰也 附子湯主之 均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
發熱頭痛 身體疼痛 者為裏 未解麻黃湯主之 均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
沉自利 身體疼痛 者為裏 未解麻黃湯主之 均主之 厥而脈滑為裏 有熱而白虎湯加
傷寒陰厥 清者手足逆冷 是也 其手足初得病微寒者 謂
逆冷脈沉 或微而下利 清穀 或清便自調 惡寒或引衣 自
覆不飲 水或下利 清穀 或清便自調 惡寒或引衣 自
而靜無頭痛 逆湯通脈 四逆湯當歸四逆湯 證多惺惺
厥者無頭痛 逆湯通脈 四逆湯當歸四逆湯 證多惺惺
冷乃厥陰所主 陰陽之氣不相接 連而手足盡
手足指頭微冷 者理中湯少陰厥 厥一脛寒足冷甚 厥
歸四逆湯 厥逆者 燥者不治 厥陰厥 厥一脛寒足冷甚 厥

傷寒陽厥

者陽氣不足也心煩足踏者陰氣不足也
陰證四肢厥冷脈沉遲按之無力則為陰當溫之
宜四逆湯清便如常外證惺惺效
能發厥若微厥却發熱者熱深故也其脈伏不得
之滑者為裏熱或飲水或揚手擲足或煩燥不得
眠大便燥結小便赤外證悉具而見四逆者是因
證用之便秘○小下證悉具而見四逆者是因
氣不運四肢便厥須醫不識疑為陰厥者是因
如反掌大抵熱厥須脈沉伏而滑者手足雖冷時復
指爪溫須承氣湯下之○厥陰證四肢逆冷脈
甲青脈沉須承氣湯下之○厥陰證四肢逆冷脈
伏於內而後發厥微厥有頭痛身熱邪氣入陷
行則腹痛下利或便膿血若不便血則熱氣上
必為喉痺○利傷寒邪在四肢溫至少陰厥陰
及太陰則邪漸入四肢厥冷然先由熱後厥者傳
深而陷伏於內則四肢厥冷然先由熱後厥者傳

經熱厥也輕則四逆散重則大柴胡承氣湯下之
○熱厥脈沉伏而滑頭上有汗手掌溫指梢亦
下溫便宜

陰陽厥輕重

辨陰陽厥法
陰陽二脈沉而弱陽脈沉而弱陰脈沉而弱
與理中湯試之溫陰厥常冷○厥陰若未辨陰陽
厥有藏厥虵厥者發無暫定而厥者為藏厥七
氣盡故曰藏厥或吐或瀉無治法四逆湯冷飲
辨陰陽厥法
陰陽二脈沉而弱陽脈沉而弱陰脈沉而弱
與理中湯試之溫陰厥常冷○厥陰若未辨陰陽
厥有藏厥虵厥者發無暫定而厥者為藏厥七
氣盡故曰藏厥或吐或瀉無治法四逆湯冷飲

藏厥虵厥

藏厥者發無暫定而厥者為藏厥七
氣盡故曰藏厥或吐或瀉無治法四逆湯冷飲

厥與四逆不同
 少陰厥而利發躁亦不治三味
 厥而復煩吐虫而厥者不治
 四逆者四肢厥冷也傷寒邪在三
 陽則手足漸深於逆四逆而
 太陰及手足厥陰則手足厥冷
 散涼藥以治四逆不通其比四
 夫成逆者以四逆言之可治者
 四逆與手足厥冷之有輕重以
 其病為重手足厥冷之有輕重
 有所分也以四字加於逆字之
 指上言也蓋以四逆字為通指
 手足言也蓋以四逆字為通指
 手足言也

傷寒陰毒
 傷寒三陰病深必變為陰毒其
 痛頭汗下結硬臍腹築痛身如
 冷汗心下結硬臍腹築痛身如
 被杖外腎水冷其

脈附骨取之則有按之則無宜計
 氣乍復或此微證面青舌黑四
 藥感於下利或心下脹滿結燥
 腹時狂言爪甲面青舌黑四
 或以速言於氣關元各六三
 為效仍服還陽散退陰散二
 脈附骨取之則有按之則無宜計
 可數至此藥有難為之功宜灸
 更以還陽散熱藥助之如手不
 治以還陽散等藥助之如手不
 五日可治傷寒散等藥助之如
 用正陽散七日陰毒不可治甘
 一人傷寒四肢逆冷不可治甘
 毒也急服金液丹來復丹仍灸
 滑證乃陰而有陽脈得汗而
 百壯乃陰而有陽脈得汗而
 正陽散各二錢生皂角一挺麝
 香一兩乾薑炮甘草灸

錢水一盃煎至五分和渣
熟服一方用白湯調下

甘草湯 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯
煎服一名升麻驚甲湯

返陰丹 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯

復陽丹 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯

還陽散 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯

退陰散 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯

汗出而
差轉

附子散 治傷寒陰毒
煎服一名升麻驚甲湯

白朮散 治傷寒陰毒
煎服一名升麻驚甲湯

迴陽救急湯 治傷寒陰毒
煎服一名升麻驚甲湯

熨臍法 治陰毒各一錢半
煎服一名升麻驚甲湯

乾薑炮肉桂附子炮
煎服一名升麻驚甲湯

煎服一名升麻驚甲湯

煎服一名升麻驚甲湯

煎服一名升麻驚甲湯

煎服一名升麻驚甲湯

五餅先將麝香硫磺各一字填臍內效蕙餅於臍
上以熨斗熨之如餅爛再換新餅又熨之以蕙
氣入腹為效手足溫有汗即差更服四逆湯以溫
其內如熨後手足指尚冷甲下肉黑者死逆湯以溫
法醋醋拌熨之尤速效納布
袋中蒸熱熨之速效納布

傷寒陽毒

傷寒陽毒或傷本陽證誤投熱藥使陽毒入深發為狂亂
面赤發斑紅身發斑黃或下利黃赤六脈洪大消斑青
陽毒發斑紅身發斑黃或下利黃赤六脈洪大消斑青
喉痛唾膿血五日可治七日不可治
湯兩日或赤或黃葛根湯外用水漬法宜陽毒升麻
者輕則三黃石膏湯赤烏陽毒六脈洪大有力燥渴
勝湯重則大承氣湯下之黃巨
黑奴丸二兩黃芩發斑煩燥大渴脈洪數麻黃大黃各
服須臾振寒汗出而解示汗再服○陽毒及壞

傷寒醫所不治精魂已竭心下尚煖背開其
口灌藥下咽即活若不發斑身黃赤狂叫欲走謔語

三黃石膏湯

治陽毒發斑身黃赤狂叫欲走謔語
施仁各一錢半麻黃一錢香豉半合右剉
作一貼入薑三片細茶一錢撮水煎服○

陽毒升麻湯

治傷寒陽毒發斑身黃赤狂叫欲走謔語
角一錢半甘草七錢一分剉作一貼入
一貼水煎服出汗則解○

陽毒梔子湯

治陽毒發斑身黃赤狂叫欲走謔語
甘草五分百粒剉作一貼入
薑五片致百粒剉作一貼入

葛根湯

治陽毒發斑身黃赤狂叫欲走謔語
石膏湯去麻黃豉加芒硝大黃入薑

三黃巨勝湯

治陽毒發斑身黃赤狂叫欲走謔語
泥漿清水二匙調服○

水漬法

治新毒大熱發狂不能制伏青布五六尺墨
稍又搭用青布數十重蓋覆得汗而愈
之豆數十易被蓋退熱故也
蓋冷則再蒸湯一搭

陰盛隔陽

傷寒陰盛欲飲水復吐身大冷反躁欲投井中
沉而不飲水者無脈不鼓擊或身冷而欲坐井中欲飲水
而不入口非真熱也宜霹靂散而欲坐井中欲飲水
頭疼身熱傷寒六脈沉伏不見深按至骨則若有識
許用熱藥則為陰中伏陽也仲景法中無此證
若用冷藥則為真火消須用破散引真陽反生客熱
之藥用返陰丹二粒消須用破散引真陽反生客熱
躁狂汗出足冷身冷矣
略睡汗出足冷身冷矣

陽盛拒陰

傷寒陽盛拒陰其證身熱體冷此大熱證也脈數按
黃而身反勝湯坊宜三指下非真寒也此大熱證也脈數按

陰極似陽

於煩躁不深不能至火極似水謂之反化亢
極則害之義也煩躁而引極自覆於外雖燥渴而
狀若不陽證然身沉細無此乃陰所致也
四逆湯下脈必沉細無此乃陰所致也
四逆湯下脈必沉細無此乃陰所致也

陽極似陰

陽證之極熱伏於內故身涼四肢厥逆氣色
光潤脈必沉滑而有力此陽之極也宜大柴胡
湯或白虎湯而陰錯難之宜用從治法
治者反治也熱藥冷飲之宜用從治法
而佐以涼藥或熱藥冷飲之宜用從治法
霹靂散時許取出陽證附子一箇炮過以灰半

霹靂散時許取出陽證附子一箇炮過以灰半

煎至六分去渣入熟蜜半匙放冷服之須臾燥止
 得睡汗出差即一熟蜜方附子一匙燒存性炒培
 一為未入臘茶二錢分作二貼白黑龍散水
 迴陽返本湯 治陰虛陽弱
 麥冬五味甘草炙甘草入蜜七匙連
 和放作一貼以清泥漿二盞煎去滓入蜜七匙黃連
 煎服同
 傷寒雜證 面日舌色合病併病煩躁戰慄動悸動氣等
 傷寒頭痛身疼百節痛 傷寒頭痛身疼百節痛惡寒惡熱往來寒熱看

傷寒頭痛身疼百節痛 傷寒頭痛身疼百節痛
 骨節俱痛身疼腰痛以至牽連
 不刺故也 淵○傷寒頭痛知邪在經也頭痛身熱與強脈
 知邪不在經也 淵○傷寒頭痛知邪在經也頭痛身熱與強脈
 會○三陽之病有頭痛三陰無頭痛惟血脈凝滯所
 會於頭顛故有頭痛三陰無頭痛惟血脈凝滯所

惡寒惡熱往來寒熱 傷寒頭痛身疼百節痛
 渴以少身痛太陽身痛拘急而身少痛宛如被絞硬嘔
 者為熱邪與陰相爭為熱邪在表半裏熱
 與陽爭而為寒內與陰爭為熱邪在表半裏熱
 宜小柴胡湯和之發於陰也發於陽者惡寒發於
 陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者惡寒發於
 於陰者六日愈以陽者易愈七陰者難愈也發於
 惡寒者微發熱者多易愈七陰者難愈也發於
 病不解風反惡寒者虛也為藥甘湯主之汗後
 風者見風至則惡寒者虛也為藥甘湯主之汗後
 坦然自舒惡寒者則活人云惡寒者不自寒雖身大熱而
 不欲去衣者是也活人云惡寒者不自寒雖身大熱而
 寒惡風者當惡風而憎寒乃發熱無病入脈微而自其
 入亡血病者當惡風而憎寒乃發熱無病入脈微而自其
 欲着復衣則盛寒也此由醫者過為汗然者陽氣微則
 惡寒陰弱則發熱也此由醫者過為汗然者陽氣微則
 又下陰弱則發熱也此由醫者過為汗然者陽氣微則
 內微不能勝冷故欲着復衣冬月陽氣在裏胃中

東醫寶鑑卷之二
 六十一

煩熱陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身也
 寒雖裏證悉具若有一毫惡寒者為表邪未盡須
 先解表乃攻裏也
 五種脈浮而緊發熱惡寒者傷寒也
 熱惡寒或膈滿嘔吐此傷食也
 惡寒或眩嘔吐是風痰也
 惡寒或欲思飲是欲作瘧疾也
 巧藥甘草湯治汗後惡寒欲作瘧疾也
 芍藥甘草湯治汗後惡寒欲作瘧疾也
 水煎服

傷寒看面目舌色

陽下虛故也
 赤色者陽氣怫鬱在表常解之
 雖赤而不紅活乃下虛也
 陽盛者面赤而光
 名曰戴陽證
 陶氏益元湯主之
 少陰病汗下利脈沉而遲其人面少赤
 必鬱冒汗出而解所以遲然者其面戴
 陽下虛故也
 赤色者陽氣怫鬱在表常解之
 雖赤而不紅活乃下虛也
 陽盛者面赤而光
 名曰戴陽證
 陶氏益元湯主之

傷寒合病或三陽同病不傳者謂之合病
 傷寒合病或三陽同病不傳者謂之合病
 傷寒合病或三陽同病不傳者謂之合病

陶氏益元湯

背黃眼胞忽陷定知亡
 平其人大大煩目重臉內
 傷寒日赤為陽毒已黃
 不明謂神水已竭不能照
 順氣湯下之無精光者死
 水入府屬半表半裏以
 胎者熱已入胃調胃承氣
 芒刺者是腎水剋心火急
 極也鑿是治法取井水浸
 以生薑胎自退時
 刮舌黑胎自退時
 冬黃連知母各七分
 薑五片棗二枚蔥白三莖
 去滓效令
 服之

東醫寶鑑卷之二十一

傷寒併病
併熱自汗
傷寒併病
併氣盛者
併一併併
併陽氣衰
併卒歸於
併一併併
併獨重初
併證亦不
和湯
俱熱自汗
三陽或腹
滿身重面
垢語遺尿
中外

傷寒煩燥
煩燥乃不安
心中懊憹
欲吐之貌
躁則手足
動起

腎主津液
腎宜黃連
雞子熱則
甘草用施
子以治肺
豆莢以潤

者煩燥者
煩燥者入
於肺也燥
者血也火
入於腎也

有腹滿者
有腹滿者
宜施子厚
朴宜下之
煩燥者

消穀微煩
消穀微煩
者以微煩
新損穀則
愈則脾煩
躁者尚氣
弱不能

引也

煩躁吉凶

內外熱曰
煩躁也內
謂心中鬱
煩也外熱
故曰煩躁
謂氣

及先煩後
煩者皆治
外熱為根
之也無根
之火故曰
煩躁

復煩也從
煩至躁為
所謂燥煩
者謂先發
者燥也先
運

煩躁脚攣
乾煩躁吐
逆更作甘
草乾薑湯
與之復其
伸若厥

懊憹怫鬱
寒非痛終
夜下後大
便不通已
三日矣非
燥許學士
承

寒非痛終
夜下後大
便不通已
三日矣非
燥許學士
承

東晉寶鑑卷之...

六十一

氣湯下燥屎二十枚得利而解仲景云小便利下
大便難時有微熱所以不得眠也胃中燥大便堅者
則臥不安此夜所非躁也非寒
必痛語以心非中燥也非寒
非痛語以心非中燥也非寒

黃連雞子湯

治少陰病煩燥不得臥

甘草乾薑湯

治煩躁吐逆而厥一貼水煎服

芍藥甘草湯

治煩燥見脚

梔子豉湯

傷寒汗下後虛煩不得眠者必反覆顛

至一盞也梔子七箇豉半合右剉水二盞先煎梔子
再服一盞納梔子再前至七分去渣溫服得吐止未吐
○若胃滿而嘔加生薑名口甘草豉生薑湯○草湯
虛者心鬱不舒也其證或因誤下正氣也
虛陽邪內陷結於其間重則為結胃也

梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿卧起不安
一錢半厚朴三錢枳實二錢方剉作一

傷寒

戰慄者帝曰人之振寒若何氣使然岐伯曰寒氣
○戰者身爲之戰也戰而振也戰而振也戰而振也
則鼓慄者身爲之戰也戰而振也戰而振也戰而振也
之與振者身爲之戰也戰而振也戰而振也戰而振也
冒不仁以胃無氣也戰而振也戰而振也戰而振也
爭也氣則戰者身爲之戰也戰而振也戰而振也戰而振也
陰所制故心陽大足汗以解則必藥也探出陰陽爲
事宜理中四逆湯者大柴胡湯○邪表證者汗解
活沖和湯裏證者入虛弱發戰而汗不行即昏
者解也少陽也老入虛弱發戰而汗不行即昏
而解者少陽也老入虛弱發戰而汗不行即昏
治悶者不

傷寒論卷之六

傷寒動

傷寒動甚傷寒過多其人又手足自冒心下悸欲得按
汗後臍下悸欲作奔豚宜茯苓湯
代心動悸宜炙甘草湯
升陽散
火湯

桂枝甘草湯

治心悸欲得按桂枝四錢甘草
二錢右剉作一貼水煎服

茯苓桂枝湯

治臍下悸欲作奔豚茯苓六錢桂枝四
錢甘草二錢右剉作一貼入棗五枚

陶氏升陽散火湯

治撮空摸床入參當歸芍藥柴胡黃芩白朮
弱不能主持此因肝熱乘肺元氣虛
冒心或撮空摸床入參當歸芍藥柴胡黃芩白朮
麥門冬陳皮茯苓神甘草各一錢右剉作一貼入薑
三片棗二枚入
熟金同煎服

傷寒動氣

入動氣者為築築然動跳於腹者是也復因傷

寒新邪與舊積相搏而痛築築然跳動名曰動氣
大槩虛者理中湯去白朮加肉桂熱者宜柴胡桂
枝湯心最急桂枝湯加桂一倍

動氣在右

不可發汗發汗則不可下下之則津液內竭
咽燥鼻乾頭眩心悸

動氣在左

不可發汗發汗則頭眩汗不出筋惕肉瞤
宜防風白朮牡蠣湯

動氣在上

不可發汗發汗則氣上衝正在心端宜甘
浮冷熱汗自出

動氣在下

不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節若
起頭眩食則下清穀心下痞

柴胡桂枝湯 治傷寒動氣藥柴胡二錢桂枝黃芩

五分右剉作一貼入薑

防風白朮牡蠣湯 治動氣發汗筋惕肉瞤防風牡

酒或米飲調

甘李根湯 治氣誤發汗氣上衝正在心端李根皮

一錢半夏甘草各五分右剉

大橘皮湯 治動氣誤發汗心煩骨痛目暈吐食陳皮

棗三枚水煎服

東醫寶鑑雜病篇卷之二

