



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



武英殿藏書  
卷之九  
七

藏書

圖書

陽明上篇

小承氣湯

大黃 四兩

厚朴 二兩 炙

枳實 三枚 大

去皮

微炙

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫  
二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者  
勿服之

論曰比大承氣單去芒硝耳芒硝古名鹽硝與硝  
石不同硝石乃火硝可爲火藥者其味辛苦微鹽  
而氣溫其性上升故亦破積散堅治諸熱火鬱調

和臟腑虛寒。腦痛欲歟。并治喉痺五淋黑疸發背。手足不遂。皆取升散也。若芒硝其性走下。故惟蕩滌腸胃。積滯以其鹽寒。足以軟堅去實熱也。然總不至堅者不可用。蓋大黃清血分之熱。故得大黃而瀉不止者。飲粥湯。胃得穀氣即止。以胃之氣分不傷也。合芒硝則并氣分而峻寒之矣。非有大熱者。何以堪之。人身溫煖之氣乃元氣也。一傷猝難驟復。故必熱邪太甚。然後兼用之。所謂有病當之也。觀仲景增此一味而曰大減。此一味即曰小。

且諸所欲下者。必曰先與小承氣。則芒硝之峻可知。至調胃承氣反去枳朴。不去芒硝。乃爲熱甚。而胃氣不和者。恐其破氣。故去枳朴。而加甘草。以培養其根本。故曰調胃。非謂熱不甚者。亦可用也。

調胃承氣湯

大黃四兩去皮 清酒浸 甘草二兩炙味甘平 芒硝半觔味鹹苦大寒  
右三味㕮咀。以水三升。煮取一升。去滓。內芒硝更上火微煮。令沸。少少溫服。入

論曰。此比大小承氣獨有甘草。而無枳朴爲異耳。

仲景用此湯，凡七見。或因吐下，津乾，或因煩滿氣熱，總爲胃中燥熱不和，而非太實滿者比。故不欲其速下而去枳朴，欲其戀鬲而生津，特加甘草以調和之。故曰：調胃。狀胃既熒結，至須硝黃開之，則其氣之壅而不接可知。承者順也，順其氣而接之也。故亦曰承氣。合觀仲景治熱邪內入，曰陷胸邪高，在胸上也。曰瀉心邪，居在心下也。曰調胃邪，竟在心下之胃池，卽胸心胃三字地分了。狀狀治胸，曰陷謂邪。雖高比虛煩者全裏而不兼表矣。故後

虛煩證，以梔豉輕湧者，此宜以大黃芒硝甘遂等，陷之使下，義取陷身陣內而攻克也。治心曰瀉，謂邪在此，不過熱邪痰飲膠結比胸，則稍低比胃，則無實導而去之，其勢順故曰瀉也。治胃曰承氣，謂胃乃大小腸膀胱轉運之本氣化，則能出有熱有物，以滯之氣不承順，則壅而不和，故義取調而下之，甚則大承氣，不甚則小承氣也。門人問曰：陷胸瀉心調胃，得先生一為析義，可開千古聾贖，但觀仲景論，結胸每日心下因鞶，豈必胸上為結乎？曰

傷寒原方發明

仲景不云結胸者項亦強如柔痉狀乎項且強則項之下可知特可按者惟心下故註病狀曰心下鞶立湯名則曰陷胸也

猪苓湯

猪苓去皮味

茯苓味甘平

甘膠味甘平

滑石碎味甘

澤瀉味甘鹹寒

各一兩

右五味以水四升先煮四味取一升去滓內下

阿膠烊消盡溫服七合日三服

論曰五苓太陽藥也故用桂枝白朮

猪苓湯易以

阿膠滑石則爲導水滋陰蕩熱利竅之劑而非太陽藥矣故少陰病下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者用之謂下利六七日本熱和寒解之時尚兼欬渴不眠等症是熱邪搏結水飲以故羈留不去故用以利水潤燥若脉浮發熱渴欲飲水小便不利安知非太陽膀胱瘀熱而亦用猪苓湯以其從陽明來即不得復責膀胱而用五苓也唯義取滋陰導水故陽明病汗多而渴者猪苓湯即在所禁若五苓則一見陽明有汗症便禁用不必多而

渴矣以邪不在膀胱而用桂卽是誅責無過也

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩味苦微寒梔子十四枚擘大黃二兩去皮苦寒

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿復減黃從小便去也

論曰發黃則邪遍周身似乎膚腠爲病但頭汗出身無汗劑須而還小便不利渴飲水漿則邪實有

結意比穀痺之頭眩則頭汗爲熱多且穀痺飽而

微煩不渴則此之渴飲水漿爲熱甚又身無汗小便不利則中之熱因溼鬱而氣不化更可知故以茵陳山梔合大黃解散溼熱非下之也欲其自內而達外也太黃之性速入血分不能緩解氣鬱之熱同卮子茵陳則能宣溼而化熱傷寒六七日身黃如橘色亦用此湯謂茵陳合大黃則鬱去而黃退大黃合卮子則便利而溼行耳若寇氏治僧之傷寒汗不徹發黃熱多期年不愈去大黃而加秦艽升麻則以外熱多而全責肌表矣且內無結聚

雖有熱非如頭汗出，剝而還渴，飲水漸之甚也。

葛根散。葛根一錢，大黃頭炒，生薑一錢，水煎服。葛根散。葛根一錢，大黃頭炒，生薑一錢，水煎服。葛根散。葛根一錢，大黃頭炒，生薑一錢，水煎服。

陽明中篇

蜜煎導方

蜜七合，一味內銅氣，中微火煎之，稍凝似飴狀，攬之勿令焦著，欲可丸，併手捻作挺，令頭銳大如指長一寸許，當熱時急作冷，則硬以內穀道中，以手急抱，欲太便時乃去之。

猪膽導方

大猪膽一枚，瀉汁和醋少許，以灌穀道中，如丁食頃當大便出。

論曰此爲大便不行而一無所苦者設也。結胸痞胃有燥屎臟結皆有現證今一無所苦但自汗且小便利是鬱熱燥乾非堅結也故以甘寒苦寒者一洩其氣猶之硝黃開結而反從下達邪低故也若見實滿等證則小便利正屬可攻之候矣。

大承氣湯

大黃四兩苦寒酒洗

厚朴半斤苦溫炙去皮

枳實五枚味苦寒炙

芒硝三合味鹹寒

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大

黃煮取二升去滓內芒硝更上火微兩沸分溫再服得下餘勿服

論曰朴去痞枳泄滿硝軟堅黃泄實海藏謂必痞滿燥實四證全而後可用不易之論矣總以太便實爲主便實必以手足濺然汗出爲第一驗蓋表解後周身無汗而手足濺然汗出爲第二驗。蓋表諸陽之本獨蒸蒸而潤也但外之解不解內之燥不燥虛不虛非手足汗之所能盡故表則驗之惡寒或無汗或脈浮則表尙未清也內則驗之不轉

失氣或臍腹痛或脈弱或便溏或小便不利或熱微或熱不潮則裏實未甚也以消息燥實痞滿四字方確然脉證參差又不可泥如汗多微微惡寒脈遲禁下若脉遲汗出而兼見不惡寒身重短氣腹滿喘潮熱卽爲外欲解可攻裏之象以裏熱多故知脉遲爲表欲解也若煩躁心下鞭而無太陽柴胡證似可下矣然脉弱雖能食不可以爲胃強而輕下也不太便六七日似可下矣然小便少屎未定鞭故雖能食不可以爲燥屎而輕下也至讞語

有潮熱反不能食等症則真胃中有燥屎矣大承氣雖重劑以此詳辨寧有悞乎

麻仁丸

即脾約丸也

麻子仁

二升味甘平

芍藥

半斤味酸平

大黃

一斤去皮味苦寒

枳實

半升炙味苦寒

厚朴

一斤炙去皮味苦寒

杏仁

一升去皮尖熬別作脂甘溫

右六味爲末煉蜜爲丸桐子大飲服十九日三服漸加以和爲度

論曰約者約少也乃脾中素有燥熱津液不足故

外邪入裏益增其燥而約二三日所食之物爲一二彈丸此燥熱以乾之非脾弱也故仲景變太陽禁下之例另立麻仁丸以潤之不比一時暫結者可用湯藥蕩滌耳仲景所謂胃强者亦謂脾土過燥使腸胃津液枯槁化熱致中消便少是胃亦因脾之強而強強卽邪矣非強於脾之謂也使脾果弱非溏卽瀉焉能反約少胃中之穀食乎

少陽全篇

小柴胡湯

柴胡半斤味苦微寒

黃芩三兩味苦寒

人參三兩味甘溫

甘草三兩味甘平

半夏半升洗味辛溫

生薑三兩切味辛溫

大棗十三枚擘味甘平

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括糞實一枚

若渴者去半夏加人參合煎成四兩半括蔓根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥二兩若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫服取微汗愈若欬者夫人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

論曰傷風與寒有裏卽不可攻表有表卽不可攻裏此定法也少陽爲半表裏故凡見少陽一證卽不可從太陽爲治而用小柴胡蓋柴胡能引清氣

而行陽道又能引胃氣上行而行春令又能散諸經血結氣聚故凡邪之表裏混雜者俱藉之以提出少陽俾循經次而出所以仲景取用獨多而尤于傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者爲的對之劑謂風寒之外邪挾身中之痰飲結聚少陽本位所以胸脇苦滿熱逼心間所以心煩喜嘔胸脇旣滿胃中之水穀亦不消所以不欲食於是邪入而併於陰則寒出而併於陽則熱故不問傳經或直中緊以小柴胡和

之柴胡者。少陽主藥也。兼黃芩邪入內則熱也。兼半夏生薑有飲而嘔逆也。兼參甘棗養正而調其陰陽。小柴胡得擅和解之功。實賴此也。然人之氣體所挾不同。故以柴甘生薑爲定藥。餘則增減隨症耳。若口苦咽乾。熱聚於膽也。目眩木盛生風而旋暈也。爲少陽本病。前證中不槩列。亦有無是證不可拘也。

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡半斤味苦平

桂枝三兩味辛熱

乾薑三兩味辛熱

括蔞根四兩味苦寒

黃芩三兩味苦寒

牡蠣三兩熬味鹹寒

甘草二兩炙味甘平

右七味以水一斗二升。煮取六升去滓再煎。取三升溫服。一升日二服。初服微煩。復服汗出便愈。

論曰。從來太陽證見一證涉少陽。卽禁汗下。以邪在半表。非汗下之所能盡也。此以傷寒發汗必有半裏之邪未服。略見內證。而又復誤下也。邪兼半表而攻其內外。故邪在少陽者。往來寒熱而心煩。

邪本太陽者。胸脇滿微結。其小便不利渴而不嘔者。汗下亡津液而內燥也。若使邪盛而渴者。其人必嘔矣。其頭汗者。必初發汗時。下原未得汗而又下之。於是津亡而渴。又加胸滿微結。邪已內入。而身之汗益難。初之誤汗。徒虛其上。而頭爲之汗。故從和解之法。而用小柴胡以渴去半夏。以胸滿微結去人參。加桂枝以從太陽。加乾薑以散滿。加括薑根以滋內乾。加牡蠣以更結也。彼以結胸無外熱。裏熱爲多。故從下奪之法。而用陷胸。此則往來

寒熱表多裏少。故惟和解爲妥耳。

合病併病篇

桂枝加葛根湯

麻黃疑誤入

葛根四兩

芍藥二兩

甘草一二兩

生薑三兩

大棗十二枚擘

桂枝三兩去皮

麻黃三兩去節

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減半升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服升一升覆取微似汗不須歇粥餘如桂枝法論曰太陽中風自汗凡几項背強几几頸不舒也。

傷寒原方發明

而項背強狀亦可意會矣。頸項屬陽明。但此爲太陽初入陽明。未至兩經各半。故仲景於此不言令病止以葛根一味。加入桂枝湯。使邪還太陽爲易也。然不歎粥。蓋葛根之輕揚已足引陽明襲邪。共桂枝成解肌之功耳。

葛根湯 有麻黃者

葛根 四兩

麻黃 三兩  
去節

桂 三兩  
去皮

芍藥 二兩  
切

甘草 二兩  
炙

生薑 三兩  
切

大棗 十二枚  
擘

右七味㕮咀。以水一斗先煮麻黃。葛根減一升去沫。內諸藥煮取二升。去滓溫服。一升覆取微似汗。不須歎粥。餘如桂枝法。將息及禁忌論曰。葛根陽明藥也。項強。几几爲陽明的證。故太陽病讒見此。一證卽以有汗爲風。無汗爲寒。而於桂枝麻黃湯中。各加葛根。以盡其用。然彼不名葛根湯。但言桂枝加葛根。以桂枝全湯僅加此一味也。此獨更名葛根湯者。見寒邪既欲傳於陽明。則胸間之喘自止。自可不用杏仁。故不於麻黃全方。

加葛根。反用桂枝全方。加麻黃葛根。恐其寒少也。  
故雖意主加入麻黃湯。而不得謂麻黃湯加葛根耳。若太陽陽明合病。自下利者。用葛根湯成說。謂邪并於陽。則陽實而陰虛。陰虛下利。故以葛根湯散其餘邪。如是則葛根一味爲陽明矣。獨用入麻黃義。何取乎。蓋寒邪屬陰。陰性下行。故合陽明胃中之水穀而下奔治寒。以麻黃爲主。故必合麻黃。葛根竝加之。亦不用杏仁。因其勢已下趨。不欲復利之也。

葛根加半夏湯

大棗十二枚

半夏半升洗

甘草炙二兩

芍藥二兩

麻黃三兩去節湯炮

去黃汁焙乾秤

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減一升去白沫。內諸藥煮取三升去滓溫服。一升覆取微似

汗。

論曰。仲景於太陽陽明合病。自下利者。以爲兼寒而用。麻黃葛根加入桂枝全方矣。若不利而加葛根。則葛根加半夏湯四兩

傷寒原方發明  
則是兼風，風屬陽。故合陽明胃中之水飲而上逆。  
故於葛根湯全方復加半夏以去其逆，猶之小柴  
胡治半表裏而未全入裏者，不脫半夏爲治也。若  
槩如成無巳邪，并於陽，則陽實而陰虛，陰虛必下。  
利之說，則此之合病獨非邪？并於陽乎？何以不下  
利而獨嘔？故知下利不下利有挾寒、挾風之不同  
也。

黃芩湯

黃芩三兩味

甘草二兩炙

芍藥二兩味

大棗十二枚擘

味甘溫

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服，夜一服。若嘔者加半夏半升生薑三兩論曰：太少合病下利既非若太陽陽明合病表證多亦非若陽明少陽合病裏證多汗下皆不宜卽小柴胡亦嫌遺邦太陽故用小柴胡之三桂枝湯之二合而和之。精神全在合字，不復顧太少之表矣。然因此悟桂枝湯意，桂枝爲太陽主藥，合薑棗行脾之津液而和其外，因其自汗陰陽不和以甘

芍和其內而共成解肌之功。此以合病治合不治表故單用甘芍和陰以管太陽之邪。并悟小柴胡湯意。柴胡爲少陽主藥。合薑半以去少陽之飲。而和其半表。因表邪入內則熱。以芩甘參棗之甘寒。半而和裏之半。故單用芩棗以管少陽之邪。體究病情。用藥變化。豈不於此並見哉。

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘。依

黃芩湯法服

論曰。黃芩湯既爲太少合病下利不易之方矣。多嘔加薑半。始知小柴胡之加薑棗益分而爲用也。意在薑半以滌飲止嘔。參棗以和中。芩甘以清熱也。觀此之嘔加生薑半夏。曉然自明。否則不嘔何獨加棗而去薑耶。

痰病篇

瓜蒂散

瓜蒂一分熬黃  
赤小豆一分味  
味苦寒  
酸溫

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢七以  
香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和  
散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡

血虛家不可與瓜蒂散

論曰痰飲在胸變態不一寒而不熱則有手足厥  
冷一證何以知非中寒則以乍緊之脉別之緊而

曰。乍是卽診時。前後不緊偶現。緊形也。熱而兼濕。則有心中滿煩。飢不能食。下證原無他證。而但胸中作楚。故不必以脉別之。若病如桂枝證。是發熱。汗出。而惡寒矣。然且頭不痛項不強。非全乎表證。胷中痞鞕。又類結胷。寸脉不沉而微浮。是邪不在裏。不在表而在胷中。况氣上冲。胸咽喉不得息。如果表病初發。何至于是。明知是痰。而曰胸有寒者。痰本于寒也。已上三證。槩以瓜蒂之苦合赤小豆之酸。以湧之。所謂高者。因而越之也。其形容。痰證。

寒熱微甚。可爲備矣。然特列之。傷寒證中者。謂厥冷似虛寒。煩滿似痞。如桂枝證似表。故特拈出。以示辨耳。

太陰全篇

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯方內更加芍藥三兩連前共六兩餘

依桂枝湯法

論曰太陰腹滿時痛有直中者有傳經者有誤下  
內陷者惟誤下爲輕淺蓋太陽誤下之變每在胸  
脇胸脇不虛而脾獨受傷是越經而爲變也脾之  
受邪原淺但邪雖入陰位而太陽之邪毫未料理  
故但倍芍藥大和脾氣以收太陰之逆而仍以桂

枝治其本經之邪，提之使出太陽，不比直中者竟治太陰耳。若傳經者虛實寒熱所因不同，藥亦不一矣。

桂枝加大黃湯

桂枝三兩去皮  
大黃一兩  
芍藥六兩

生薑三兩切

甘草二兩炙  
大棗十二枚

右六味以水七升，煮取三升，去滓溫服一升，日

三服。

論曰：腹非胸脇之比。腹滿時痛，病淺宜和。而太實

太滿勢在必下。但邪既入陰，又非寒下所宜，益表邪以誤下，而乘虛陷入，卽實滿亦因表邪而增勢。非陽分熱結之比也。故於桂枝原方加入大黃實滿，一去而桂甘爲功于表。薑棗芍藥旋覆効和脾之力，所謂一舉兩得耳。

少陰前篇一舉而解其  
散亡去而甘升氣平。走葛葉六草散  
表而汗出。散之以出。故此卦卦氣太散。人體大虛。  
汗以歸之而來。故前人謂實能承因遠追而對接。  
大散華亦必下卧。承謂入通天非矣。不被真益也。

少陰前篇

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩去節

細辛二兩味

味甘熱

辛熱

附子一牧炮去皮

破八片辛熱

右三味以水一斗先煮麻黃減一升去上沫內

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

論曰三陰必以溫經之藥爲發散使邪出而真陽  
不出故麻黃附子細辛湯人皆知附子溫經麻細  
表散而不知寒邪必由皮毛皮毛者肺之合也麻

黃爲肺家專藥。故以治寒所從入非卽解少陰之寒也。附子入少陰固矣。細辛爲手少陰引經之藥而香味俱細能入腎且力兼驅表邪散浮熱是從內達外賴此以爲旗鼓故較麻黃附子甘草湯此爲重劑然少陰病明有脈細沉數病爲在裏不可發汗之禁又有八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血之條此脉沉身熱似乎非麻附所宜。豈知陰病難於得熱脉雖沉而發熱則邪猶在表矣。況日初得之則客邪尙淺非七八日邪已入裏矣。

之比耶。

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩去節 甘草二兩炙 附子一枚炮

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

論曰此較加細辛者易甘草爲調停其藥勢之緩多矣因細詳立方之意言少陰病二三日比初得之略多一二百矣日數多而無裏證寒邪所入尚淺是以陰象不能驟發故將此湯微發汗微云者

傷寒原方發明

因○病○情○不○卽○內○入○而○輕○爲○外○引○也○此○如○桂○麻○二○湯○之○有○昔○越○婢○同○其○委○曲○彌○縫○而○已○

附子湯

附子二枚去皮 茯苓三兩味 人參二兩味

白术

四兩味

芍藥

三兩味

酸平

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日

三服

論曰附子湯取爲少陰中直捷中正之方蓋陰邪稍緩卽變熱而爲上下攻衝之證便須曲爲斟量

回護若但背惡寒乃陽弱陰勝之常所謂無熱惡寒發於陰也更口中和則與咽乾煩渴者異矣故灸之而又以此湯溫補其中若身體痛手足寒骨節痛脈沉亦寒邪內中之本證故亦以此湯溫補之而無所回護取附子茯苓下溫其經不用乾薑之剛燥更以芍藥監之而附力乃更柔緩且以參术徐培其中土而附特爲鎮攝之主羽扇輪巾難以狀其從容決勝之度矣

吳茱萸湯

吳茱萸

一升洗味辛熱

人參三兩味甘溫

生薑六兩切

味辛溫

大棗十二枚擘

味甘溫

右四味以水七升煮取一升去滓溫服七合日

三服

論曰凡治病因食作楚者槩作陽明此大法也故食難用飽飽則微煩之陽明卽爲穀瀉嘔屬太陽食穀而嘔卽似陽明受寒故以吳茱萸治胸中逆氣滿塞然而增劇則仍是因火故云屬上焦也明非下焦寒逆之比所以用吳茱萸爲誤也若吐利

厥逆至○於煩躁欲死方是腎中之陰氣上逆故以吳茱萸下逆氣人參薑棗培土腎氣自不能上陵雖亦溫中實下其逆耳若乾嘔吐涎沫是寒侵厥陰肝木乘脾土而陰氣逆上亦用吳茱萸湯泄逆好古所謂衝脉爲病逆氣裏急宜此主之蓋腎肝同治也按東垣曰濁陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞪陰寒膈塞氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利宜以吳茱萸之苦熱泄其逆氣用之如神諸藥不可代則知肝腎



葱白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生去皮破八片

人尿 五合味

猪膽汁 一味苦寒

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服若無猪膽羊膽亦可用論曰白通湯本取通脈而沉者起微者盛也反厥逆無脉乾嘔而煩是葱白能通上而不能通下是微陽之欲散未散者因葱而上越故爲嘔爲煩非徒無益而又害之也然非葱白薑附之辛熱猝難宣發則葱白之用豈爲過乎責在無向導矣故以

人尿猪膽汁引之但炎上之火收之極難故脉忌暴出謂與下之凝寒竟不相屬則相離而絕也

通脈四逆湯

甘草 三兩炙

附子 大者一枚生用去皮破八片

乾薑 三兩強人

可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脉卽出者愈

加減法

面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二

兩嘔者加生薑二兩，咽痛者去芍藥加桔梗一  
兩，利止脉不出者去桔梗加人參二兩。  
論曰：寒見寒證，熱見熱證，此其常也。寒熱證並見，  
是陰寒隔陽於外，不能內返也。故少陰病下利清  
穀，厥逆脉微，腹痛寒也。而反外熱，不惡寒面赤乾  
嘔，咽痛則爲陰陽相喫。而元陽飛散之機，卽於四  
逆加葱以入陰而迎陽，又倍乾薑以壯溫煖之氣。  
加甘草一兩，以大和調之用，蓋通之於外，正攝之  
於內也。甚至戴陽汗出者亦用之，則合甘草乾薑，  
確矣。

太甘太熱之間，有妙用耳。雖汗出而不忌葱可知。  
此證之急務，妙在通之也。已故藥同四逆，而另作  
湯，名重在加減也。至於利止脉不出，正經所謂脈  
微而利，亡血也。又非一通可愈，故更加以人參，然  
觀面色赤加葱九莖，則知隔陽之證，當以戴陽爲  
通脉四逆湯加猪膽汁

於四逆湯方內加入猪膽汁半合餘，依前法服。  
如無猪膽以羊膽代之。

論曰。吐汗厥相續而至。邪總不解。而反四肢拘急。脉微欲絕。陽因汗吐而欲亡矣。唯宜內和。不堪外散。但恐扞格不入。故同白通湯之用。猪膽汁而獨不用葱白。內有甘草乾薑之多。爲功於裏。猶如生薑大棗之爲功於表耳。

黃連阿膠湯

少陰後篇

黃連

四兩味  
苦寒

黃芩

一兩味  
苦寒

芍藥

二兩味  
酸平

鷄子黃

二枚味  
甘溫

阿膠

三兩味  
甘溫

右五味以水五升先煮三物。取一升去滓。內膠  
烊盡。小冷。內鷄子黃攬令相得溫服。七合日三

服

論曰。少陰本證。脈微細。但欲寐者。人身衛氣行陽。  
則寤。行陰則寐。邪入少陰。則衛氣搏於陰而不能。

傷寒廁加發明

出故但欲寐。於是下利嘔逆。乃陰邪內熾也。因而汗出煩躁。是真陽欲亡也。若一無此等證。但心煩不得眠。且在一三日傳經陽邪至此。不爲日淺矣。明是真陰爲邪熱所燶。始而衛氣從邪留陰而欲寐。陽之陷也。今且陰氣反從火化。行陽分致不得眠。陵心爲煩。陰之消也。故以芩連直折其火爲君。以鷄子黃混沌未鑿之元陰。阿井乃天地尾閭之真水。挾黑驢皮潤燥驅風而爲膠者。育其陰之本。復以白芍之酸寒收攝其外亡之微陰。較之四逆。

等湯一水一火。天地懸隔。此治少陰太分別大關鍵。也不可草草略過。

桃花湯

赤石脂一斤一半全用一乾薑一兩味  
半篩末甘溫

粳米一升味

日平

右三味以水七升煮米令熟去滓。溫服七合。內赤石脂末方寸匕。日三服愈。餘弗服。  
論曰。下利便膿血腹痛。小便不利。古註以爲寒。視其所用之藥。皆溫熱也。喻先生以爲熱。謂小便不

利非下熱不能且有見血無寒及血得熱而妄行之語也。不知病既屬少陰邪因經而寒。自二三日至四五日則寒鬱而熱矣。正如滯下之證必由於暑而暑氣之所以陷入則由寒冷遏抑使然故涼藥清暑熱藥劫鬱皆可愈此以石脂固脫粳米調中而以乾薑爲散本寒劫標熱之總司如無胎患否則以寒藥治熱熱未去而寒復傷如之何故只自利便膿血而無腹痛小便不利證亦主之謂下泄必由中虛是方顧本慮標溫中以固洩當下之

猪膚湯

寒熱總不深較耳。

猪膚一斤味甘寒

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服論曰猪膚者猪厚皮去肥白油者也白粉白米粉也此雖治咽痛然以通三焦斷下利爲急故以猪膚一味入腎潤燥仍以蜜粉熬香健脾止泄此比甘結等湯爲探本之劑矣。

甘草湯

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日一服

論曰甘草一味單行氣能和陰而清衝任之熱每見生便癰者驟煎四兩頓服立愈則其能清少陰客熱可知所以爲咽痛專方也

桔梗湯

桔梗一兩味辛

甘草二兩味甘平

右一味以水三升煮一升去滓分溫再服論曰若此湯則與甘草一味迥然不同矣桔梗有開提之功又桔梗味苦甘草味甘苦相合有和其陰陽之義初用甘草不瘥便須防其陰陽不和故續用之然必客熱之淺者與少陰之陰尚可支持者爲宜故此與甘草湯皆必二三日內纔用之耳

半夏散及湯

半夏洗味辛

桂枝去皮味辛熱

甘草炙味甘平上各等分

已上三味各別搗篩已合治之自飲和服方七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散一兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥乏

論曰此又咽痛方中之變者矣蓋咽痛當清少陰客熱故猪膚湯以之調中而滋腎甘草及甘桔湯雖清熱開提不同同於清少陰之邪故三方皆重劑所謂補下治下制以急也若苦酒湯及此湯皆以去痰爲務治在上焦故劑皆極少然此加桂甘

則更巧矣少陰之邪原從太陽來故於去痰藥中入此一味仍欲向太陽提出其火邪但必審微有表意者方爲合法

苦酒湯

半夏洗破如棗核大十四枚味辛溫鷄子丁枚去黃內上苦酒右二味內半夏著苦酒中以鷄子殼置刀鑊中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服之

論曰此爲痰飲咽痛設也鷄子兼清其熱耳然此

傷寒原方發明

三

與黃連阿膠湯之用鷄子黃又不同矣。黃象地氣爲濁陰血分藥也。白象天氣爲清陽氣分藥也。故去黃以清在上之氣熱。合苦酒以斂浮濁之虛火而無取乎刺之重。但盡葛中所有。少少含嚥。所謂補上治上。制以緩也。

四逆散

甘草

炙味  
甘平

枳實

破水漬炙  
乾味苦寒

柴胡

味苦  
寒

芍藥

味酸  
微寒

右四味各十分搗飾。白飲和服。方寸七日二服。

加減法

欬者。加五味子乾薑各五分。并主下利。悸者。加桂枝五分。小便不利者。加茯苓五分。腹中痛者。加附子一枚炮。令拆泄利下重者。先以水五升。煮薤白三升。煮取三升。去滓。以散三方寸七內。湯中煮取一升半。分溫再服。

論曰。初入陰經。當溫固也。故四逆湯及通脈等湯。乃治法之正也。然此爲直中。及誤汗下。而陰勝者。則相宜矣。亦有腎水衰薄邪。入則擾動真陽。因而

蘊熱爲患者。況傳經之邪。本係熱邪。槩與溫經。豈非以火濟火乎。四肢者。諸陽之本也。邪在二陽。則熱至太陰。則溫至少陰。則逆而不溫。至厥陰。則厥冷而甚。於逆客邪漸入。其熱漸深。正氣不相接。故厥也。或溫之。或涼之。此正治陰經之太關鍵處。故喻先生以嘔欬下利。四肢沉重爲水飲橫溢之徵。以心煩舌燥咽乾。不眠爲真陽內擾之機。此辨之至悉者也。而黃連阿膠苦酒。猪苓。猪膚等湯。立方之意了然。然皆意在滋陰。若四逆散似獨以清熱之。

和解爲重矣。蓋四逆爲邪壅正氣。或欬悸小便不利。或腹痛泄利。下重。雖上下寒熱不同。總陰之不與陽通。而各自爲病也。故取柴胡以解其邪。甘芍以和其陰。而以枳實爲通達陰陽之主藥。雖不峻。漸可轉逆爲順。故亦得有四逆之名。藥劑極大。腎肝位遠也。此爲和解至平之劑。不堪任重。故以治四逆爲主。復設種種加法耳。

厥陰全篇

烏梅圓

- |     |      |    |    |
|-----|------|----|----|
| 以烏梅 | 三百箇  | 細辛 | 六兩 |
|     | 味酸溫  |    | 辛熱 |
| 黃連  | 一斤   | 當歸 | 四兩 |
|     | 苦寒   |    | 辛溫 |
| 蜀椒  | 四兩去子 | 桂枝 | 六兩 |
|     | 辛熱   |    | 辛熱 |
| 黃蘖  | 六兩   | 人參 | 六兩 |
|     | 苦寒   |    | 甘溫 |

右十味異搗篩合治之。以苦酒漬烏梅一宿去核。蒸之五升米下飯熟。搗成泥。和藥令相得。內白中與蜜杵一千下圓。如梧桐子大。先食飲服。

十九日三服稍加至二十圓禁生冷滑物臭食等

論曰。耽厥比。厥。雖爲易治。然厥。由無陽。耽厥亦因厥寒。不能自安。而上入其膈。特邪。有淺深。一則須臾得止。一則無暫安時。故須以吐。耽辨腎邪之微甚。而類聚辛熱。以溫之監。以黃蘖。烏梅。黃連。以安其耽。參歸以補其虛也。然此方寒熱兼施。氣血並補。故便膿之久利。以陰陽錯雜。亦能主之。況烏梅黃連。正爲滯下。主藥也。仲景每以生附配乾

薑。此獨用熟附。彼兼解散。此專治寒耳。

當歸四逆湯

當歸三兩  
桂枝三兩  
芍藥二兩  
大棗三十五  
甘草二兩  
細辛二兩  
通草二兩  
甘平

右七味以水八升。煮取三升。去滓。溫服。一升。日三服。

論曰。雖有四逆之名。比四逆散更斟酌矣。蓋脈主血。虛細。主亡血。至細而欲絕。則血已無。不但不可

下。并不可溫。故宜歸芍養血。而用桂甘太棗。以和其陰陽。細辛通草以通其心腎。不用薑附。以劫其陰。謂脈之虛細。本是陽氣衰微。而陰血更爲不足。則有陽未回。而陰先絕之慮耳。

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸三兩

芍藥三兩

甘草二兩

通草二兩

桂枝三兩

細辛二兩

生薑半斤

大棗二十五枚

吳茱萸二斤

右九味以水六升清酒六升。和煮取五升去滓。

溫分五服。一方水酒各四升。  
論曰。手足厥寒。脉細欲絕。是經絡無所不寒。氣血俱虛之至。故當歸四逆。允爲合劑矣。更察內有久寒。是一陽不足以爲開泰之本。而經絡之虛乃相因。以至。故以吳茱萸細辛通逆。而潤腎燥。通草爲引。復以桂枝全湯。而君以當歸。血由氣生。寒從陽化也。并可通於雜證之血虛極寒者矣。

麻黃升麻湯

麻黃二兩半去節甘溫升麻一兩一分甘平當歸一兩一分辛溫

知母 苦寒

黃芩 苦寒

歲蕤 甘平各  
十八銖

石膏 碎綿裹  
甘寒

白术 甘溫

乾薑 辛熱

芍藥 酸平

天門冬 去心  
甘平

桂枝 辛熱

茯苓 甘平

甘草 炙甘平  
各六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫  
內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三  
斗米項令盡汗出愈

論曰大下後則氣血俱傷可知於是寸脉沉遲月

是陽去入陰之象因而手足厥冷泄利不止下部

脈不至故以芩术乾薑壯其陽歸蕤天冬養其陰  
桂甘芍藥和其榮衛而以升麻提其下陷之氣知  
母石膏黃芩清肺之熱而以麻黃散而洩之耳然  
而下部脈雖不至泄利雖不止非竟純陰無陽也  
木過快藥下利重亡津液故厥陰之脈隨經射肺  
而肺之津液亦亡乃咽喉不利而吐膿血遂成肺  
痿也病惟表裏錯雜藥亦兼而調之君以升麻則  
下無不舉君以麻黃則內無不出故曰麻黃升麻  
湯。

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑

辛熱去皮三兩

黃連

三兩去鬚苦寒

黃芩

三兩苦寒

人參

三兩甘溫

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服論曰傷寒二字讀斷則所云本自寒下其爲平日胃氣虛寒明甚但傷寒誤吐下則應變結胸等證今以本自寒下變反在中宮而成寒格故以參薑大溫其中佐以芩連而下其逆也此乃誤吐下之變證故亦變法治之耳

白頭翁湯

白頭翁

三兩苦寒

黃連

三兩去鬚苦寒

黃芩

三兩去皮苦寒

秦皮

三兩苦寒

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升不

愈更服一升

論曰此主熱利下重舊謂熱傷腎腎欲堅故食苦以堅之是矣然苦藥多何獨取此蓋不重者乃熱傷氣故陷下而重也陷下則傷陰陰傷則血熱故以白頭翁清血熱卽其善治鼻衄可知腎肝同

治故以秦皮和肝陰卽其善治目疾可知黃連者  
清脾中鬱熱也黃蘖者堅北方元陰也雖後重而  
不用一味調氣之藥病已不在氣耳後人以紫血  
証熱利二字是也然未若仲景自註云下利欲飲  
水者以有熱故也飲水與渴不同渴但津乾欲水  
則是陰分爲火爍欲得涼以解之也而陰血之熱  
亦在其中矣

過經不解篇

柴胡加芒硝湯

於小柴胡湯方內加芒硝六兩餘依前法服不  
解更服

論曰此卽大柴胡兩解之意也但此無枳芍大黃  
而加芒硝謂此之脇滿潮熱嘔利雖似大柴胡證  
曾經誤用丸藥下之引熱邪內陷而不利非芒硝  
無以蕩胃中之熱且陰已被傷無所事芍藥之和  
也然此以加芒硝名湯則知大柴胡設無大黃不

成湯矣。合觀大柴胡及加芒硝湯。大柴胡乃未經汗下而熱邪。自甚者。故以小柴解半表裏。加枳芍大黃以緩解其上下之裏熱。此湯乃因丸藥誤下。引客邪陷入之過。則客邪驟而淺上。乃因邪而熱下。未必卽熱矣。故但以芒硝加入小柴使和解之外。假硝性之急暴而清熱者。驟解其上。則下之協熱暫利者。不治自清矣。

瘧後勞復及陰陽易病篇

枳實梔子豉湯

枳實三枚炙

梔子十四枚

豉一斤綿

苦寒

苦寒

右三味以清漿水七升空。煮取四升。內枳實梔子。煮取二升。下豉更煮五六沸去滓。溫分再服。

覆令微似汗。

論曰。仲景治勞復食復亦巢用和解汗下三法。但和解以小柴胡爲主。而汗下唯枳實梔子豉一方。亦巧矣哉。梔豉本爲湧劑。此獨用之以微發汗。非

謂病後中虛不堪湧也。傷寒爲風寒外入之表勞復爲餘熱內起之邪。表邪貴湧故施政湯必先表施子後內政則上湧而不下。施子厚朴湯恐枳朴下走故同表而合其氣使枳朴利氣之性隨施子而成功於一湧此則先以清漿水七升空表取四升內枳實施子又次內政蓋水熟則速下故不先表施子而合枳實同煎借水勢以急下留苦性以微汗謂一切桂麻等湯固係發表非其所宜卽湧亦驅入裏之表治餘熱內起未爲合法耳施政之

宜發合熟水枳實下墜之勢既爲驅熱定方於是  
有宿食者加大黃如博碁子大餘熱不殺穀原非  
如表邪內入者之堅結而難開也

牡蠣澤瀉散

牡蠣鹹平熬

澤瀉鹹寒

括蔞根苦寒

蜀漆辛平洗

葶藶苦寒

商陸根熬辛鹹

海藻鹹寒洗去鹹

已上各等分

右七味異搗下篩爲散更入白朮中治之白飲和服方寸匕七小便利止後服日三服

論曰腰以下有水氣乃陰邪不盡由汗解故滯而爲水也然人之身半以上爲陽身半以下爲陰病極而侵陽勢所必至故於未侵陽界之時峻劑以攻之所謂未濟而擊之稍緩則有滅趾之慮也專利小便者金匱曰腰以下腫當利小便也然藥止七不用淡味而取鹹者四苦寒者二辛平者一葢陰邪久結必成溼熱堅凝在下驟難開發故鹹以軟堅寒以清熱利水以滲溼也蜀漆括蔥根兼導飲而散結葶藶洩氣閉以開水道謂水非氣閉

理中丸

不能結耳

人參 甘溫

甘草 炙甘平

白朮 甘溫

乾薑 辛熱各三兩

右四味搗篩爲末蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

加減法

若臍上築者，腎氣動也。去术加桂四兩。吐多者去术加生薑三兩。下多者還用术。悸者加茯苓二兩。渴欲得水者加术足前成四兩半。腹中痛者加人參足前成四兩半。寒者加乾薑足前成四兩半。腹滿者去术加附子一枚。服湯後如食墳飲熱粥一升許。微自汗勿發揭衣被。

論曰：病後喜唾久不了了。此胃虛寒伏宜理中以培其本也。霍亂頭痛發熱身疼但不用水亦用理

中者蓋頭痛發熱邪由風寒中乃陰陽之界也。未知陽邪陰邪故以飲水爲熱。熱則知陽邪居陽分而稍高。以不飲水爲寒。寒則陰邪居陰分而稍下。陽邪用五苓者責在太陽也。陰邪用理中者責在太陰也。然中土爲萬物之本。故理中政可通治一切。所以加減法獨多。若臍上築去术吐多去术腹滿去术皆惡其壅也。差後渴欲得水反加术者津液不足。則邪反營之。故加术以壯其正氣而虛熱去津自生矣。若今人則反加涼藥以清之滑藥以

潤之。寧知此理哉。

竹葉石膏湯

竹葉二把

石膏一斤

半夏半升洗

人參三兩

甘草二兩甘

粳米半升甘

麥門冬一升甘

微寒

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服。

論曰俗醫不知氣盛與氣逆之不同。概以枳朴傷其至高。又不知中氣虛逆與火逆不同。概以生薑。

爲嘔逆仙藥試觀仲景竹葉石膏一湯則虛熱之辨涇渭了然。傷寒解後虛羸少氣。氣爲餘熱所傷故飲食不能爲飢膚也。氣逆欲吐。胃弱而餘邪復挾津液上逆也。故以竹葉石膏清熱。參甘麥冬粳米固本半夏散逆。蓋竹葉能除新久風邪之煩熱。能止喘促氣滯之上衝。故以爲君。合參麥等用之治熱而無損其真。導逆而不傷其氣也。若生薑可以宣偶鬱之火。而不能清凝結之熱。枳朴可以以下客氣有餘。而不能降熱。傷之逆故皆不用也。至石

膏一昧。因能助肺氣清暑熱。故有白虎湯之名。今人不察證之陰陽。熱之高下。乃真畏之如虎。尤爲可笑。不知傷寒之邪。皆屬陽經。陽經之邪。非沉寒之藥所能勝。其餘邪上逆。何獨不然。故必用之。以清邪之原也。每見俗醫不忌芩連之苦寒。而畏石膏之辛涼。總由不知辨證耳。

燒裯散

右取婦人中視近隱處剪燒灰。以水和服。方寸七日二服。小便即利。陰頭微腫。則愈。婦人病。取

男子視襦燒灰

論曰。男女相易之病。氣入骨中。乃陰毒熾盛之病。其體重。非復陰寒下重之謂也。陰毒甚。陽爲陰所吸。故不用而體重。氣并入陰。故少氣。少腹裏急。陰不和也。引陰中拘攣。膝脛拘急者。熱邪下注也。熱上冲胸。頭重。不欲舉。眼中生花者。陰中毒氣隨衛氣上升。如陽邪之上。但氣本濁陰。故爲重。爲花。耳用燒裯散者。始以一絛之氣。引之使入。仍以同氣之陰。相易。引之。謬所謂來處來去處去。非他藥。

可愈耳。

更若不風。而。體。虛。并。人。猶。為。少。麻。少。栗。東。參。附。  
其。精。重。非。更。無。寒。不。虛。文。體。也。蜀。藥。其。精。重。附。  
歸。日。遇。支。脉。暴。大。熱。躁。人。子。中。然。復。虛。火。  
良。干。勝。醫。火。

立光寺

